


緊急度判定体系実証検証事業資料

緊急度判定プロトコル VER.0

家庭自己判断プロトコル

【家庭自己判断アルゴリズム】



No	症状	症状例
1	呼吸が苦しい	「息が苦しい」「呼吸が苦しい」「息苦しい」「息が荒い」「肩で息している」「息ができない」など
2	呼吸がゼーゼーする	「ゼーゼーいつている」「ヒューヒューいつている」「息をするときに音がする」「痰(たん)がからんだような音がする」など
3	ぜんそく発作	「喘息なんですけど…」など
4	動悸(胸がドキドキする)	「ドキドキする」「動悸がする」「脈が速い」「脈がとぶ」など
5	意識がない・意識がおかしい	「反応がない」「意識がないようだ」「変なことを言う」「うわごとを言っている」「いつもと様子が違う」など
6	けいれん	「ひきつけ」「てんかん」「ガタガタ震えている」「泡を吹いている」「白目をむいている」など
7	頭痛	「頭が痛い」「後頭部が痛い」「頭痛がすると行って倒れた」など
8	胸が痛い	「胸が痛い」「胸が苦しい」など
9	背中が痛い	「背中が痛い」「背骨が痛い」など
10	成人の発熱(16歳以上)	「熱が出た」「悪寒がする」「震えている」など
11	腹痛	「おなかが痛い」「みぞおちが痛い」「下腹が痛い」「わき腹が痛い」「おなかが張る」「足の付け根が痛い」など
12	吐き気・吐いた	「吐いた」「吐き気」など
13	めまい・ふらつき	「めまい」「目が回る」「めまいがする」など
14	しびれ	「手足がしびれる」「手足の感覚がおかしい」「手足がマヒしている」「手足が動かない」など
15	腰痛	「腰が痛い」「ぎっくり腰」「腰痛」など
16	何か固形物を飲み込んだ	「何か固形物を飲み込んだ」「食べ物などがのどにつかえた」「のどに引っかかっている・取れない」など
17	小児の発熱(15歳以下)	「熱が出た」「熱がある」「体が熱い」「悪寒がする」「震えている」「熱が下がらない」など
18	小児の吐き気・吐いた(15歳以下)	「吐いた」「吐いている」「吐きそう」「気持ちが悪そう」など
19	小児の頭のけが・首のけが(15歳以下)	「頭をぶつけた」「落ちた」「頭から血が出た」など

次の場合は、救急車等で緊急受診が必要です。
 呼吸をしていない。息がない。
 脈がない。心臓が止まっている。
 水没している。冷たくなっている。

Q1	(いつもどおり)ふつうにしゃべれていますか？ 声は出せていますか？	「はい」→Q2へ 「いいえ」→赤
Q2	ハアハアしますか(ハアハアしていますか)？ 息は苦しい(苦しそう)ですか？	「はい」→「呼吸困難」の項目へ 「いいえ」→Q3へ
Q3	顔色、唇、耳の色が悪いですか？ 冷や汗をかいていますか？	「はい」→赤 「いいえ」→Q4へ
Q4	しっかりと受け答えが出来ますか？	「はい」→各症状の項目へ 「いいえ」→「意識障害」の項目へ

類型	緊急度	定義(案)
(赤)	緊急	・直ちに受診が必要です。 ・今すぐ救急車等で病院に受診して下さい。
(黄)	準緊急	・2時間以内に受診が必要です。
(緑)	低緊急	・緊急ではありませんが、医療機関に受診して下さい。 ・夜間でしたら翌日の診察でもかまいません。
(白)	非緊急	・家庭での経過観察または通常診療時間内での受診を勧めます。

1 呼吸が苦しい

「息が苦しい」「呼吸が苦しい」「息苦しい」「息が荒い」「肩で息している」「息ができない」など

家庭 自己判断	センテンス
1r01	急に息苦しくなった。
1r02	胸の痛みがある。
1r03	泡のようなピンク色または白い痰がたくさん出る。
1r04	しばらく(数時間程度)今の状態が続いている。
1r05	以前に肺梗塞(エコノミークラス/ロングフライト症候群、深部静脈血栓症、下肢静脈血栓症など)または気胸、自然気胸、慢性呼吸不全と言われたことがある。
1r06	ぜんそくと言われたことがあり、ぜんそくの薬が効かなかったことがある。
1r07	何か変なものを吸い込んだ。または吐いた後や、むせた後から息苦しくなった。
1r08	横になると息苦しい。または苦しくて座らないと息ができない。
1y01	深呼吸することができない。
1y02	最近けがをした、または、手術を受けたことがある。
1y03	(女性のみ)最近、出産の経験がある、または、妊娠の可能性がある、または、妊娠している。
1y04	アレルギーがある。
1y05	せき、または黄色や緑色の痰(たん)が出ている。
1y06	熱がある。
1g01	指や顔がしびれたり、ピリピリしたりする。
1g02	最近ストレスが多い。
1g03	かぜのような症状(発熱・寒気・頭痛・せき・鼻水など)がある。
1g04	鼻づまりがある。
1w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

2 呼吸がゼーゼーする

「ゼーゼーいっている」「ヒューヒューいっている」「息をするときに音がする」「痰(たん)がからんだような音がする」など

家庭 自己判断	センテンス
2r01	横になると息苦しい、または、苦しくて座らないと息ができない。
2r02	胸の痛みがある。
2r03	突然(2時間以内が目安)症状が始まった。
2r04	何か変なものを吸い込んだ。またはその可能性がある。
2r05	泡のようなピンク色または白い痰がたくさん出る。
2y01	ぜんそくがある。
2y02	せき、または黄色や緑色の痰(たん)が出る。
2y03	アレルギーがある。
2y04	慢性心不全、心臓の病気、肺梗塞、脚の血栓または腎臓の病気がある。
2y05	このような症状が以前にもあった。
2y06	熱がある。
2g01	以上の項目にあてはまらない。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

3 ぜんそく発作

「喘息なんですが…」など

家庭 自己判断	センテンス
3r01	横になると息苦しい。または苦しくて座らないと息ができない。
3r02	手持ちの薬を使っても苦しい、または苦しさがとれない。
3y01	のどの痛み、またはかぜのような症状(発熱・寒気・頭痛・せき・鼻水など)がある。
3y02	ステロイド薬を飲んでいる、または、吸入している。
3y03	吐いた後、または、むせた後に症状が出た。
3y04	頻繁に、または何度か、ぜんそくで入院したことがある。
3y05	集中治療室で治療を受けたことがある。
3y06	最近処方された薬が効かない。
3y07	黄色や緑色の痰(たん)が出ている。
3g01	以上の項目にあてはまらない。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

4 動悸(胸がドキドキする)

「ドキドキする」「動悸がする」「脈が速い」「脈がとぶ」など

家庭 自己判断	センテンス
4r01	動悸(胸のドキドキ)が30分以上続いている。
4r02	息苦しい。
4r03	胸の圧迫感(押される感じ)がある。
4r04	胸がもやもやする感じがある。または胸が苦しい。
4r05	胸の痛みが30分以上続いている。
4r06	冷汗をかいている。
4r07	痛みが周りに拡がる感じがある。または胸、首、あご、腕のいずれかの痛み、または変な感じがある。
4r08	尿の量が減ったり、尿の色が濃くなったりしている。
4r09	皮膚や唇が渴いている。
4r10	のどがとても渇く。
4r11	立ちくらみがする。
4r12	胸やけがする。
4r13	脈が極端に速い[または]遅い。
4y01	頭痛がある。
4r02	甲状腺の病気がある。
4y02	心臓の病気がある。
4r03	このような症状がよくおこる。
4y03	吐いたり、下痢をしたりしている。
4r04	脈の異常(脈がとぶ、脈のリズムが乱れるなどの症状)がある。
4y04	体重が増えている。またはむくみがひどい。
4r05	(女性のみ)妊娠している。
4g01	脈の異常(脈がとぶ、脈のリズムが乱れる、脈が速いなどの症状)の治療を受けたことがある。
4g02	最近、以下の薬のいずれかを内服した。 (利尿薬、ダイエット薬、うっ血の改善薬、かぜ薬)
4g03	ぜんそくの持病があり、最近新しい内服薬の処方、または内服薬の増量があった。
4g04	不眠がある。
4g05	最近ストレスが増えた。
4g06	カフェイン、タバコ、アルコール、漢方の興奮薬のいずれかを過量に服用した。
4g07	熱がある。
4g08	30分以内に運動した。
4g09	疲労感がある。
4w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

5 意識がない・意識がおかしい

「反応がない」「意識がないようだ」「変なことを言う」「うわごとを言っている」「いつもと様子が違う」など

家庭 自己判断	センテンス
5r01	突然おかしくなった。
5r02	話し方がおかしい。またはろれつが回らない。
5r03	こちらの言うことを聞かない。
5r04	あばれたり、いつもと違う行動をする。
5r05	手足の動きが悪い。またはどちらかの手足が動かない。または手足に力が入らない。
5r06	頭を打った後である。
5r07	出血している。
5r08	頭をひどく痛がっている。
5r09	吐いた。
5r10	熱がある。
5r11	けいれんをおこした。またはけいれんしている。
5r12	何か薬を飲んだ。
5r13	大量に酒を飲んだばかりである。またはその可能性がある。
5r14	糖尿病がある。
5r15	肝臓が悪いと言われている。または黄疸（皮膚や目の白い部分が黄色っぽくなること）が出ている。
5r16	不整脈（脈がとぶ、脈のリズムが乱れるなど）がある。
5y01	最初の状態より落ち着いてきている。
5y02	アルコール依存症である。またはそう言われたことがある。
5y03	尿の量が減ったり、尿の色が濃くなったりしている。
5y04	皮膚や唇が乾いている。
5y05	のどがとても渇く。
5y06	立ちくらみがおきた。
5y08	しばらく意識がなかったが今はいつもと同じである。
5y09	もともと寝たきりである。
5y10	認知症がある。
5g01	いつもと変わらない様子である。いつもと同じように受け答えできる。
5w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

6 けいれん

「ひきつけ」「てんかん」「ガタガタ震えている」「泡を吹いている」「白目をむいている」など

家庭 自己判断	センテンス
6r01	けいれんが今も続いている。
6r02	呼びかけに対して返事が出来ない。
6r03	けいれんを起こす前に、頭や顔にけがをした。
6r04	倒れたとき頭を打った。または頭から出血している。または舌をかんだ。
6r05	会話ができない。
6r06	またけいれんを起こしそうだ。または何かおかしい。または落ち着かない。
6r07	熱がある。
6r08	手足が動かせない。
6r09	頭痛がある。
6r10	初めてのけいれんである。
6y01	けいれん止めの薬を切らしている。
6y02	今までけいれんを起こしたことがある。
6w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

7 頭痛

「頭が痛い」「後頭部が痛い」「頭痛がすると言って倒れた」など

家庭 自己判断	センテンス
7r01	強い吐き気がある、または、吐いた。
7r02	いつもの頭痛と違ってひどい頭痛である。
7r03	突然ガンと頭を殴られたようなひどい痛みである。
7r04	今まで経験したことのないようなひどい痛みである。
7r05	痛みがだんだん強くなっている。
7r06	手足がしびれたり、力が入らなかつたりする。
7r07	体がフワフワしている。またはめまいがする。
7r08	眼がかすむ。または他の目の症状（黒くなって見えないところがある、見え方がおかしいなど）がある。
7r09	動けない。
7r10	変なことを言っている。または目の焦点が合っていない。またはもうろうとしている。
7r11	けいれんしている。またはけいれんしていた。
7r12	呼びかけても返事をしない。
7y01	38℃以上の熱がある。
7y02	かぜのような症状（発熱・寒気・頭痛・せき・鼻水など）がある。
7y03	（治療薬を飲んだ場合）薬を飲んでもよくなるしない。
7y04	頭をぶつけた。
7y05	頭痛で病院にかかったことがある。または今まで病院で片頭痛、緊張型頭痛、または群発頭痛などと言われたことがある。
7y06	頭痛が続いている。
7y07	いつもの頭痛と同じである。
7g01	日頃から飲んでいる頭痛薬（市販薬も含む）を切らしてしまった。
7w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

8 胸が痛い

「胸が痛い」「胸が苦しい」など

家庭 自己判断	センテンス
8r01	胸が締め付けられる感じがある、または、胸が押される感じがある、または、胸がもよもよする感じがある、または、胸が裂けるような痛みがある。
8r02	首、あご、肩甲骨、背中、または腕のいずれかにも痛みが広がっている。
8r03	息切れ、めまい、または脱力感(体に力が入らない)がある。
8r04	手足が冷たい、または湿っている(じっとりしている)。
8r05	吐いた。または吐き気がある。
8r06	安静にしても胸が痛い。
8r07	動悸(ドキドキする感じ)または脈がとぶ感じがありますか？
8r08	処方されている薬(ニトログリセリン、フランドルテープなど)を使っても胸の痛みがおさまらない。
8r09	長時間座りっぱなし、または長時間同じ姿勢だった、または旅行などの後に痛み出した。
8r10	心臓の病気をしたことがある。またはいつもの発作とは違う。
8r11	ピル(避妊薬)を飲んでいる。
8r12	足の痛み、腫れ、むくみ、赤味、熱っぽい感じ のいずれかがある。
8r13	急に足首が腫れてきた。
8r14	血の混じった痰(たん)が出てきた。
8r15	けが、事故、妊娠、出産、手術、血液の病気(血液凝固異常)を経験または指摘されたことがある。
8r16	血が止まりにくい。
8y01	最近けがをして、体を動かすと痛みが増す。
8y02	深呼吸、またはせきによって胸が痛む。
8y03	その場所を押すと痛い。
8y04	痛みの部分がはっきりしている。
8y05	熱がある。
8y06	せき、または、黄色や緑色の痰(たん)が出ている。
8g01	以上の項目にあてはまらない。

1203	65歳以上である。または15歳以下である。または妊娠している。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	
1204	糖尿病がある。	
1205	慢性腎不全がある。	
1206	喫煙歴がある。	
1207	高血圧がある。	

9 背中が痛い

「背中が痛い」「背骨が痛い」など

家庭 自己判断	センテンス
9r01	突然の痛みで、痛みが強くなっている。
9r02	胸の痛みがある。
9r03	急に足がしびれたり、足のだるさが強くなっている。または足を動かさない。
9r04	強く痛む場所が移動する。
9r05	裂けるような痛みがある。
9r06	赤い尿が出て、尿をするときに激しい痛みがある。
9r07	便や尿が漏れる。
9r08	吐き気がある。または吐いた。または発熱がある。
9y01	尿が出にくい。またはトイレに行っても出ない。
9y02	頻繁にトイレに行く。または尿をするときに痛みがある。
9y03	長時間座りっぱなし、または長時間同じ姿勢だった、または旅行などの後に痛み出した。
9y04	お尻や腰から足へひびくような痛みがある。
9y05	歩きにくい。歩行しづらい。
9y06	痛み止めが効かない。
9y07	2日くらいの間にけがをした、または事故にあった。
9y08	がんや糖尿病にかかっている。または治療中である。
9y09	最近、体重が減っている。
9g01	慢性の背部痛、背部に何らかの手術、腎結石、腎臓疾患のいずれかの持病がある。
9g02	背中以外の別の部分にも痛みがある。または体の動きを妨げない程度の軽い痛みがある。
9g03	熱がある。
9w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1203	65歳以上である。または15歳以下である。または妊娠をしている。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	
1207	高血圧がある。	

10 成人の発熱(16歳以上)

「熱が出た」「悪寒がする」「震えている」など

家庭 自己判断	センテンス
10r01	起き上がることができない。
10r02	強い頭痛があって、吐いている。
10r03	[暑い所にしばらくいた。または激しい運動をした後で]かつ39度以上の発熱がある。
10r04	頭痛があり、意識がもうろうとしている、または意識状態が悪い。
10y01	皮膚や唇が乾いている。
10y02	のどがとても渇く。
10y03	尿の量が減ったり、尿の色が濃くなったりしている。
10y04	立ちくらみがおきた。
10y05	背中や脇腹に痛みがある。
10y06	暑い所にしばらくいた、または激しい運動をした後である。
10y07	頭痛がある。
10y08	食べ物などが飲み込みにくい。またはのどに痛みがある。
10y09	汚い痰(たん)、または黄色や緑色の痰が出る。
10y10	体温は40℃以上で、熱冷ましの薬(解熱薬)が効かない。
10y11	腹痛がある。
10y12	吐き気がある。
10y13	「大きな病気」(心臓の病気・肝臓病・糖尿病・ステロイド服用中・がん・その他の感染症など)を治療中である。
10y14	3日以上続く熱がある。
10y15	尿をするときに痛みがある。
10y16	全身(体の広い範囲)が赤くなっている。または発疹(体が赤くなっていたり、じんましんのようにブツブツが出ている)がある。
10y17	下痢をしている。
10y18	耳の痛みがある。
10y19	最近、手術を受けた。
10y20	(女性のみ) 膣(陰部)の痛み、またはおりものがある。
10y21	(女性のみ) 妊娠している。または出産後である。
10g04	以上の項目にあてはまらない。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

11 腹痛

「おなかが痛い」「みぞおちが痛い」「下腹が痛い」
「わき腹が痛い」「おなかが張る」「足の付け根が痛い」など

家庭 自己判断	センテンス
11r01	急に痛くなった。または強い痛みがずっと続いている。
11r02	腹痛のほかに、胸や背中にも痛みがある。
11r03	吐いたものに血が混じっている。
11r04	便に血が混じっている。または便の周りに血がついている。
11r05	(男性のみ) 陰嚢(いんのう)が腫れている。
11y01	痛みがだんだん強くなっている。
11y02	痛みが強くなったり弱くなったりしながら、今も続いている。
11y03	吐いた。または吐き気がある。
11y04	熱(38℃以上)がある。
11y05	下痢をしている。
11y06	太ももの付け根にしこりがある。
11y07	(女性のみ)妊娠している。
11y08	立ちくらみがする。
11y09	弱い腹痛があり、最近おなかの手術を受けた。
11y10	弱い腹痛があり、最近おなかにけがをしたり、大きな力を受けたりした。
11y11	腰や背中にも弱い痛みがある。
11y12	便秘がある。
11y13	(女性のみ)生理中である。
11y14	性器(陰部)からの出血がある。
11g01	同様の腹痛がよく起こる。また、同じような痛みがよく起こる。
11g02	痛いというより、漠然とした「不快感」や「おなかが張った感じ(膨満感)」がある。
11g03	痛いというより、なんとなく調子が悪いような感じである。
11w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

12 吐き気・吐いた

「吐いた」「吐き気」など

家庭 自己判断	センテンス
12r01	吐いたものに血が混じっている。
12r02	強い吐き気がある、または、嘔吐(おうと)が2日以上も続いている。
12r03	激しい腹痛がある。
12r04	おなかがパンパンに張っている。
12r05	胸、または背中への痛みがある。
12r06	ごく最近、頭・胸・腹にけがをしたり、大きな力を受けたりした。
12r07	強い頭痛がある。
12y01	吐き気がだんだん強くなっている。
12y02	頻繁に下痢をしている。
12y03	尿の量が減ったり、尿の色が濃くなったりしている。
12y04	皮膚や唇が乾いている。
12y05	のどがとても渇く。
12y06	立ちくらみがおきた。
12y07	38℃以上の熱がある。
12y08	吐き気、または嘔吐(おうと)が、強くなったり弱くなったりしながら続いている。
12y09	(女性のみ)妊娠している、または、妊娠の可能性がある。
12y10	最近、外食、生もの、保存状態のよくない食品などを食べた。
12g01	同じような症状をよく起こす。
12w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1201	65歳以上である。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

13 めまい・ふらつき

「めまい」「目が回る」「めまいがする」など

家庭 自己判断	センテンス
13r01	動けない、または、歩行や移動ができない。
13r02	急に手足の力が抜けた感じがある、または、手足が動きにくい感じがある。
13r03	下痢をしている、または、吐いている。
13r04	吐き気がする。
13r05	しゃべりにくい、または、しゃべりにくそうである。
13r06	高血圧の治療中である、または、高血圧と言われたことがある。
13r07	急に物が見えにくくなった。
13r08	脈が極端に速かったり遅かったり、乱れたりする、または、ドキドキする。
13r09	胸の痛みがある。
13r10	めまいの症状がひどい。
13r11	頭痛がある。
13y01	ここ2日以内に何らかのけがをした。
13y02	糖尿病と言われたことがある。
13y03	耳が聞こえにくい、または、耳鳴りがする、または、耳の痛みがある。
13y04	熱がある。
13y01	以上の項目にあてはまらない。

1203	65歳以上である。または15歳以下である。または妊娠している。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

14 しびれ

「手足がしびれる」「手足の感覚がおかしい」「手足がマヒしている」「手足が動かない」など

家庭 自己判断	センテンス
14r01	足を挙げるができない。
14r02	左右の腕を胸の前で平行に伸ばして姿勢を保つように指示しても、どちらかの腕が下がってしまう。
14r03	手を挙げるができない。
14r04	半身のしびれがある。
14r05	足を挙げてそのままにしても、下がってしまう。
14r06	頭痛がする。
14r07	眼がかすむ、または、視界がぼやける。
14r08	他と比べて手や足の指先が冷たい、または、色が悪い。
14r09	「今日はいい天気です」と繰り返して言うように指示しても、ろれつが回っていない、またはどこかに異常を感じる。
14r10	「今日はいい天気です」と繰り返して言うように指示しても、無言、黙っている、または、理解していない。
14r11	めまい、吐き気がある、または、吐いている。
14y01	耳が聞こえにくい、または、耳鳴りがする。
14y02	高血圧の治療中である、または、高血圧と言われたことがある。
14y03	しびれが我慢できない、または、強い痛みを伴っている。
14y04	最近重い物を持ち上げた、または、過度の運動をした。
14y05	首が重たい、こるような感じ、痛い、のいずれかの症状がある。
14y06	息が荒い、めまいがする、手・顔・唇が震える、または、手・顔・唇がしびれる、のいずれかの症状がある。
14g01	しびれ以外の症状がある。
14w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1202	歩けない。	→選択した緊急度をさらに上げる。
------	-------	------------------

15 腰痛

「腰が痛い」「ぎっくり腰」「腰痛」など

家庭 自己判断	センテンス
15r01	痛みが強くて動くことができない、または、自力で病院を受診することができない。
15r02	突然痛みだし、更に強くなってきた。
15r03	強く痛む場所が移動する。
15r04	急に足がしびれてきた、または、足のだるさが強くなっている、または、足を動かさない。
15r05	赤い尿が出た、または、尿をするとき激しい痛みがある。
15r06	便や尿が漏れる。
15y01	しりもちなどのけがの後に痛み出した。
15y02	熱があり吐いた、または、熱と吐き気がある。
15y03	尿が出にくい。または出ない。
15y04	重いものを持つなど、痛みが出たきっかけがあった。
15y05	尿をするときに痛みがある。
15y06	腰を打った後に赤い尿が出た。
15y07	腰から足へひびく痛みがある。
15y08	歩きにくい。
15y09	痛み止めが効かない。
15y10	2日ぐらいの間に、けがや事故にあっている。
15y11	がんや糖尿病にかかっている。または治療中である。
15g01	もともと腰痛もちである。または腰の手術後である。
15g02	軽い痛みであり、自分で移動することができる、または、痛みを我慢できる。
15w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

1203	65歳以上である。または15歳以下である。または妊娠している。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

16 何か固形物を飲み込んだ

「何か固形物を飲み込んだ」「食べ物などがのどにつかえた」「のどに引っかかっている・取れない」など

家庭 自己判断	センテンス
16r01	せきが出ている。
16r02	いつもの息ができない。
16r03	のど、または、胸が激しく痛む。
16r04	血を吐いた。
16r05	飲んだものに毒性がありそうだ。
16r06	とがったものを飲んだようだ。(針、くぎ、びょう、ガラス、錠剤のシートなど)
16y01	のどの異物が取れない。
16y02	吐いた、または、吐き気がある。
16y03	おなかが痛い。
16y04	ボタン型の電池を飲んだようだ。
16y05	飲んだものがわからない。
16y06	1円玉より大きなものを飲んだようだ。
16y07	のどに違和感が残っている。
16g01	1円玉より小さなものを飲んだようだ。
16g02	何かを飲み込んだが症状はない。

1203	65歳以上である。または15歳以下である。または妊娠している。	→選択した緊急度をさらに上げる。
1202	歩けない。	

17 小児の発熱(15歳以下)

「熱が出た」「熱がある」「体が熱い」「悪寒がする」「震えている」「熱が下がらない」など

家庭 自己判断	センテンス
17r01	意識がもうろうとしている、または、おかしいことを口走っている。
17r02	1日中ウトウトしている。
17r03	興奮している、または、あばれている。
17r04	ひどい頭痛がある。
17y01	生後3ヵ月未満で、38℃以上の発熱がある。
17y02	尿の量が減ったり、尿の色が濃くなったりしている。
17y03	水分を十分にとれていない。
17y04	ひどい下痢をしている。
17y05	吐き気がある。
17y06	皮膚や唇が乾いている。
17y07	ひどい腹痛がある。
17y08	ステロイド剤服用中、免疫不全、悪性腫瘍、先天性心疾患などで病院にかかっている、熱が出たらすぐ病院に行くように言われている。
17y09	暑い所にしばらくいた。または、激しい運動の後である。
17y10	熱(38℃以上41℃未満)があり、まだ病院を受診していない。
17y11	痰(たん)の絡んだせきが出る、または、黄色や緑色の鼻水が出る。
17y12	耳を痛がっている。
17y13	耳の穴から膿(うみ)が出ている、または、耳だれがある。
17y14	尿を出すときに痛がる。
17y15	全身が赤い、または、発疹(体が赤くなっている、または、じんましんのようにブツブツが出ている)がある。
17g01	以上の項目に当てはまらない。

・あまり厚着させず、熱を放散しやすい楽な服装をさせて下さい。ただし、悪寒(寒気)のあるときには毛布などで暖かくします。悪寒がなくなったら、涼しい服装にします。

・クーリングする場合には、脇下、鼠径部(股の付け根)を冷やすのが効果的です。タオルなどでくるんだ保冷剤や、濡らしてよく絞ったタオルなどを使用します。いやがるようだったら、無理にする必要はありません。

・本人用に、処方されている解熱薬があれば、38.5℃以上を目安に使用してもかまいません。

18 小児の吐き気・吐いた(15歳以下)

「吐いた」「吐いている」「吐きそう」「気持ちが悪そう」など

家庭 自己判断	センテンス
18r01	何度も繰り返し吐いている。(回数の目安:6回以上、または、吐いたものの中に食べたものや固形物が見られなくなっても2~3回以上繰り返して吐いている)
18r02	吐いたものに血、または緑がかった液体が混じっている。
18r03	38℃以上の熱がある。
18r04	尿が半日以上出ていない。
18r05	無表情でウトウトしている、または、元気がなく、ぐったりしている。
18r06	(乳児の場合) ミルクを飲んだ後に、3~4回以上ふきだすように勢いよく吐く。
18r07	強いおなかの痛みがある。
18r08	頭を激しく痛がっている。
18r09	便に血液またはイチゴゼリーのようものが混じっている。
18r10	おなかがパンパンに張っている。
18r11	泣いても涙がほとんど出ていない。
18r12	おなかを強く打った。
18y01	少しの水分をとらせても吐いてしまう。
18y02	だんだん吐き気が強くなってきている。
18y03	熱がある。
18y04	尿の量が減ったり、尿の色が濃くなったりしている。
18y05	頻繁に下痢がある。
18y06	皮膚や唇が渴いている。
18y07	せきがひどい。
18y08	現在は吐いていない、または、気持ち悪がっている。
18y09	家族・近所・保育園・幼稚園・学校などで同じような症状の人が多い。
18y10	一緒に食事をした人が、同様の症状を訴えている。
18y11	最近、外食・生もの・保存状態のよくない食品などを食べた。
18y12	便秘をしている。
18g01	同じような症状を以前からよく起こしている。
18w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。


19 小児の頭のけが・首のけが(15歳以下)

「頭をぶつけた」「落ちた」「頭から血が出た」など

家庭 自己判断	センテンス
19r01	数回にわたって吐いている。
19r02	片側の腕があがらない、または、反対側と比べてあがりが悪い、または、腕のあがり具合に左右差がある。
19r03	サラサラした液体が鼻または耳からポタポタと出ている。
19r04	押さえても、鼻血が止まらない、または、直接ぶつけていないのに耳から血が出ている。
19r05	頭からの出血が多い、または、出血をタオルやガーゼで圧迫しても止まらない。
19r06	首をかしげる姿勢をとっている、または、まっすぐ体を向かせても横を向いてしまう。
19r07	手足で動きにくいところがある。または手足にしびれがある。
19r08	けがをした後、またはけがをした時に意識がなくなった。
19r09	意識はしっかりしているが、頭が痛いと言っている。
19r10	めまいがする。
19r11	目が見えにくかったり、ものが二重に見えたりする。
19r12	1回吐き、さらに元気がない。
19r13	同じことを何度も質問する。
19r14	首の後ろ側をさわると痛がる。
19y01	起こせば起きるが、元気がない。
19y02	頭から出血していたが今は止まった、または、タオルやガーゼで圧迫して止まっている。
19y03	38℃以上の熱がある。
19y04	1回吐いたが、その後は普通である。
19y05	大きなこぶがあるが、普段と様子に変わりはない。
19g01	普段ととくに変わった様子はない。(37℃台の熱を含む)
19g02	けがをしてからすでに2日(48時間)以上経っているが心配だ。
19w01	【すべての項目に該当しない場合】 継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮。

電話相談プロトコル

【電話相談アルゴリズム】



No	症状	症状例
1	呼吸が苦しい	「息が苦しい」「呼吸が苦しい」「息苦しい」「息が荒い」「肩で息している」「息ができない」など
2	呼吸がゼーゼーする	「ゼーゼーいつている」「ヒューヒューいつている」「息をするときに音がする」「痰(たん)がからんだような音がする」など
3	ぜんそく発作	「喘息なんですが…」など
4	動悸(胸がドキドキする)	「ドキドキする」「動悸がする」「脈が速い」「脈がとぶ」など
5	意識がない・意識がおかしい	「反応がない」「意識がないようだ」「変なことを言う」「うわごとを言っている」「いつもと様子が違う」など
6	けいれん	「ひきつけ」「てんかん」「ガタガタ震えている」「泡を吹いている」「白目をむいている」など
7	頭痛	「頭が痛い」「後頭部が痛い」「頭痛がするとって倒れた」など
8	胸が痛い	「胸が痛い」「胸が苦しい」など
9	背中が痛い	「背中が痛い」「背骨が痛い」など
10	成人の発熱(16歳以上)	「熱が出た」「悪寒がする」「震えている」など
11	腹痛	「おなかが痛い」「みぞおちが痛い」「下腹が痛い」「わき腹が痛い」「おなかが張る」「足の付け根が痛い」など
12	吐き気・吐いた	「吐いた」「吐き気」など
13	めまい・ふらつき	「めまい」「目が回る」「めまいがする」など
14	しびれ	「手足がしびれる」「手足の感覚がおかしい」「手足がマヒしている」「手足が動かない」など
15	腰痛	「腰が痛い」「ぎっくり腰」「腰痛」など
16	何か固形物を飲み込んだ	「何か固形物を飲み込んだ」「食べ物などがのどにつかえた」「のどに引っかかっている・取れない」など
17	小児の発熱(15歳以下)	「熱が出た」「熱がある」「体が熱い」「悪寒がする」「震えている」「熱が下がらない」など
18	小児の吐き気・吐いた(15歳以下)	「吐いた」「吐いている」「吐きそう」「気持ちが悪そう」など
19	小児の頭のけが・首のけが(15歳以下)	「頭をぶつけた」「落ちた」「頭から血が出た」など

No	症状	症状例
1	呼吸が苦しい	「息が苦しい」「呼吸が苦しい」「息苦しい」「息が荒い」「肩で息している」「息ができない」など
2	呼吸がゼーゼーする	「ゼーゼーいつている」「ヒューヒューいつている」「息をするときに音がする」「痰(たん)がからんだような音がする」など
3	ぜんそく発作	「喘息なんですけど…」など
4	動悸(胸がドキドキする)	「ドキドキする」「動悸がする」「脈が速い」「脈がとぶ」など
5	意識がない・意識がおかしい	「反応がない」「意識がないようだ」「変なことを言う」「うわごとを言っている」「いつもと様子が違う」など
6	けいれん	「ひきつけ」「てんかん」「ガタガタ震えている」「泡を吹いている」「白目をむいている」など
7	頭痛	「頭が痛い」「後頭部が痛い」「頭痛がすると行って倒れた」など
8	胸が痛い	「胸が痛い」「胸が苦しい」など
9	背中が痛い	「背中が痛い」「背骨が痛い」など
10	成人の発熱(16歳以上)	「熱が出た」「悪寒がする」「震えている」など
11	腹痛	「おなかが痛い」「みぞおちが痛い」「下腹が痛い」「わき腹が痛い」「おなかが張る」「足の付け根が痛い」など
12	吐き気・吐いた	「吐いた」「吐き気」など
13	めまい・ふらつき	「めまい」「目が回る」「めまいがする」など
14	しびれ	「手足がしびれる」「手足の感覚がおかしい」「手足がマヒしている」「手足が動かない」など
15	腰痛	「腰が痛い」「ぎっくり腰」「腰痛」など
16	何か固形物を飲み込んだ	「何か固形物を飲み込んだ」「食べ物などがのどにつかえた」「のどに引っかかっている・取れない」など
17	小児の発熱(15歳以下)	「熱が出た」「熱がある」「体が熱い」「悪寒がする」「震えている」「熱が下がらない」など
18	小児の吐き気・吐いた(15歳以下)	「吐いた」「吐いている」「吐きそう」「気持ちが悪そう」など
19	小児の頭のけが・首のけが(15歳以下)	「頭をぶつけた」「落ちた」「頭から血が出た」など

次の場合は、**救急車等で緊急受診**が必要です。
 呼吸をしていない。息がない。
 脈がない。心臓が止まっている。
 水没している。冷たくなっている。

Q1	(いつもどおり)ふつうにしゃべれていますか？ 「はい」→Q2へ 声は出せていますか？ 「いいえ」→赤
Q2	ハアハアしますか(ハアハアしていますか)？ 「はい」→「呼吸困難」の項目へ 息は苦しい(苦しそう)ですか？ 「いいえ」→Q3へ
Q3	顔色、唇、耳の色が悪いですか？ 「はい」→赤 冷や汗をかいていますか？ 「いいえ」→Q4へ
Q4	しっかりと受け答えが出来ますか？ 「はい」→各症状の項目へ 「いいえ」→「意識障害」の項目へ

類型	緊急度	定義(案)
(赤)	緊急	・直ちに受診 が必要です。 ・今すぐ救急車等で病院に受診して下さい。
(黄)	準緊急	・2時間以内に受診が必要です。
(緑)	低緊急	・緊急ではありませんが、医療機関に受診して下さい。 ・夜間でしたら翌日の診察でもかまいません。
(白)	非緊急	・家庭での経過観察または通常診療時間内での受診を勧めます。

1 呼吸が苦しい

電話 相談	センテンス	選定科
1r01	急に息苦しくなりましたか？	
1r02	胸の痛みがありますか？	
1r03	泡状のピンク色の痰[または]白い痰がたくさん出ますか？	
1r04	しばらく(数時間程度)その状態が続いていますか？	
1r05	以前に肺梗塞(エコミークラス/ロングフライト症候群、深部静脈血栓症、下肢静脈血栓症などと説明してもよい)[または]気胸[または]自然気胸[または]慢性呼吸不全と言われたことがありますか？	
1r06	喘息と言われたことがありますか、喘息の薬が効かなかったことはありますか？	
1r07	何か変なものを吸い込みましたか？[または]息苦しさは吐いた後からですか？[または]むせた後から症状が出ましたか？	
1r08	横になると息苦しいですか？[または](苦しくて)座らないと息ができませんか？	
1y01	深呼吸をすることができませんか？	内科
1y02	最近、けが(外傷)をした[または]手術を受けたことがありますか？	内科または外科
1y03	(女性のみ)最近、出産の経験がありますか？[または]妊娠の可能性がありますか？[または]妊娠中ですか？	内科
1y04	アレルギーはありますか？	内科
1y05	咳[または]黄色～緑色の痰が出ていますか？	内科(呼吸器内科)
1y06	発熱はありますか？	科目なし
1g01	指や顔がしびれたり、ピリピリしたりしますか？	内科・かかりつけ医
1g02	最近ストレスが多いですか？	内科・かかりつけ医
1g03	風邪のような症状(発熱・悪寒・頭痛・咳・鼻汁など)はありますか？	内科
1w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1201	高齢者(65歳以上)か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

2 呼吸がゼーゼーする

電話 相談	センテンス	選定科
2r01	横になると息苦しいですか？〔または〕(苦しくて)座らないと息ができませんか？	
2r02	胸の痛みがありますか？	
2r03	突然(2時間以内が目安)始まりましたか？	
2r04	何か変なものを吸い込みましたか？〔または〕その可能性がありますか？	
2r05	泡状のピンク色の痰〔または〕白い痰がたくさん出ますか？	
2y01	喘息はありますか？	内科(呼吸器内科)
2y02	咳〔または〕黄色～緑色の痰が出ていますか？	内科(呼吸器内科)
2y03	アレルギーはありますか？	内科
2y04	慢性心不全〔または〕心疾患〔または〕肺塞栓〔または〕下肢の血栓〔または〕腎疾患 ありますか？	内科(循環器内科)
2y05	このような症状は以前にもありましたか？	内科
2y06	発熱はありますか？	内科
2g01	以上の項目にあてはまらないとき	内科

1201	高齢者(65歳以上)か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

3 ぜんそく発作

電話 相談	センテンス	選定科
3r01	横になると息苦しいですか？[または](苦しくて)座らないと息ができませんか？	
3r02	(手持ちの)薬を使ってもまだ苦しい/苦しさがとれないですか？	
3y01	喉の痛み[または]風邪のような症状(発熱・悪寒・頭痛・咳・鼻汁など)はありますか？	内科(呼吸器内科)
3y02	ステロイドを飲んでいますか？[または]吸入薬を使っていますか？	内科(呼吸器内科)
3y03	吐いた後[または]むせた後に症状が出ましたか？	内科(呼吸器内科)
3y04	頻繁に[または]何度か喘息で入院したことがありますか？	内科(呼吸器内科)
3y05	集中治療室で治療を受けたことがありますか？	内科(呼吸器内科)
3y06	最近処方された薬は効かないですか？	内科(呼吸器内科)
3y07	黄色～緑色の痰が出ていますか？	内科(呼吸器内科)
3g01	以上の項目にあてはまらないとき	内科(かかりつけ・呼吸器内科)

1201	高齢者(65歳以上)か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

4 動悸(胸がドキドキする)

電話 相談	センテンス	選定科
4r01	動悸(胸のドキドキ)は30分以上続いていますか？	
4r02	息苦しいですか？(Q6の再確認)	
4r03	胸の圧迫感がありますか？	
4r04	胸がもよもよする感じがありますか？[または]胸が苦しいですか？	
4r05	胸の痛みが30分以上続いていますか？	
4r06	冷や汗をかいていますか？(Q6の再確認)	
4r07	痛みが周りに拡がる感じがありますか？[または]胸、首、あご、腕のいずれかの痛みがありますか？[または]変な感じがありますか？	
4r08	尿量が減ったり、尿の色が濃くなったりしていますか？(脱水徴候)	
4r09	皮膚や唇が乾いていますか？(脱水徴候)	
4r10	喉がとても渇きますか？(脱水徴候)	
4r11	立ちくらみが起きましたか？(脱水徴候)	
4r12	「胸やけ」がしますか？	
4r13	脈が極端に速いですか？[または]遅いですか？	
4y01	頭痛がありますか？	内科
4r02	甲状腺の病気はありますか？(甲状腺疾患の既往)	内科
4y02	心臓の病気はありますか？(心疾患の既往)	内科(循環器内科)
4r03	このような症状がよく起こりますか？	内科
4y03	吐いたり、下痢をしたりしていますか？	内科
4r04	脈の異常(脈がとぶなどの症状)がありますか？	内科(循環器内科)
4y04	体重が増えていますか？[または]むくみがひどいですか？	内科(循環器内科)
4r05	(女性のみ)妊娠中ですか？	産婦人科(かかりつけ)
4g01	頻脈の治療を受けたことがありますか？	内科
4g02	最近、以下のいずれかを内服しましたか？:利尿薬、ダイエット薬、うっ血の改善薬、風邪薬、その他(場合によっては脱法ドラッグも念頭に置く)	内科
4g03	喘息の既往があり[かつ]最近新しい内服薬の処方[または]内服薬の増量がありましたか？	内科(かかりつけ医)
4g07	発熱はありますか？	内科
4g08	30分以内に運動しましたか？	内科(かかりつけ医)
4g09	疲労感がありますか？	内科(かかりつけ医)
4w02	不眠がありますか？	内科(かかりつけ医)
4w03	最近ストレスが増えましたか？	内科(かかりつけ医)
4w04	カフェイン、タバコ、アルコール、漢方の興奮薬のいずれかを過量に服用しましたか？	内科(かかりつけ医)
4w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1201	高齢者(65歳以上)か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

5 意識がない・意識がおかしい

電話相談	センテンス	選定科
5r01	突然おかしくなりましたか？	
5r02	話し方がおかしいですか？ 呂律が回りませんか？	
5r03	こちらの言うことを聞かないのですか？	
5r04	あばれたり、いつもと違う行動をしたりしていますか？（「自傷他害の恐れ」に注意）	
5r05	手足の動きが悪いですか？〔または〕どちらかの手足が動きませんか？〔または〕手足に力が入りませんか？	
5r06	頭部を打った後ですか？	
5r07	出血していますか？	
5r08	頭をひどく痛がっていますか？	
5r09	嘔吐しましたか？	
5r10	発熱はありますか？	
5r11	痙攣しました（しています）か？	
5r12	何か薬を飲みましたか？（飲んだ場合には）どんな薬を飲みましたか？	
5r13	大量に酒を飲んだばかりですか？〔または〕その可能性がありますか？	
5r14	糖尿病がありますか？	
5r15	肝臓が悪いと言われていませんか？〔または〕黄疸が出ていませんか？	
5r16	不整脈がありますか？	
5y01	最初の状態より落ち着いてきていますか？（最初の状態と比べてどうですか？少し落ち着いてきましたか？）	内科
5y02	アルコール依存症ですか？〔または〕そう言われたことがありますか？	内科
5y03	尿が減ったり、尿の色が濃くなったりしていますか？（脱水徴候）	内科
5y04	皮膚や唇が乾いていますか？（脱水徴候）	内科
5y05	喉がとても渇きますか？（脱水徴候）	内科
5y06	立ちくらみが起きましたか？（脱水徴候）	内科
5y07	反応がよくなったり悪くなったりを繰り返しますか？	内科
5y09	もともと寝たきりですか？	内科
5y10	認知症がありますか？	内科(かかりつけ)
5g01	いつもと変わらない様子ですか？ いつもと同じように受け答えできますか？	科目なし
5w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1201	高齢者(65歳以上)か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

6 けいれん

電話相談	センテンス	選定科
6r01	「痙攣」(相手と同じ言葉を使う)が今も続いていますか？	
6r02	返事ができませんか？	
6r03	「痙攣」(相手と同じ言葉を使う)を起こす前に頭や顔にけがをしましたか？	
6r04	倒れたとき、頭を打ちましたか？〔または〕頭から出血していますか？〔または〕舌を咬みましたか？	
6r05	会話ができませんか？(Q6の再確認)	
6r06	また起こしそうですか？〔または〕何かおかしいですか？〔または〕落ち着きませんか？	
6r07	発熱はありますか？	
6r08	手足を動かさせませんか？	
6r09	頭痛がありますか？	
6r10	初めての「痙攣」(相手と同じ言葉を使う)ですか？/こういうことは初めてですか？	内科(神経内科)
6y01	「痙攣」(相手と同じ言葉を使う)止めの薬を切らしてしまいましたか？	内科(かかりつけ・神経内科)
6y02	今まで「痙攣」(相手と同じ言葉を使う)を起こしたことはありますか？	内科(神経内科)
6w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1201	高齢者(65歳以上)か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

7 頭痛

電話相談	センテンス	選定科
7r01	強い吐き気はありますか？〔または〕吐きましたか？	
7r02	いつもの頭痛と違ってひどいですか？	
7r03	突然ガンと頭を殴られたようなひどい痛みですか？	
7r04	今まで経験したことのないようなひどい痛みですか？	
7r05	だんだん強くなっていますか？	
7r06	手足がしびれたり、力が入らなかつたりしますか？	
7r07	体がフワフワしていますか？〔または〕めまいがありますか？	
7r08	眼がかすみますか？〔または〕他の眼の症状（黒くなって見えないところがある、見え方がおかしい、など）がありますか？	
7r09	動けませんか？	
7r10	変なことを言っていますか？〔または〕目が合っていないですか？〔または〕もうろうとしていますか？	
7r11	痙攣していますか？〔または〕痙攣していましたか？	
7r12	返事しませんか？（Q6の再確認）	
7y01	発熱（38℃以上）はありますか？	内科（神経内科）
7y02	風邪のような症状（発熱・悪寒・頭痛・咳・鼻汁など）はありますか？	内科
7y03	（治療薬を飲んだ場合）薬を飲んでもよくなりませんか？	内科（かかりつけ）
7y04	頭をぶつきましたか？	脳神経外科
7y05	頭痛で病院にかかったことはありますか？〔または〕今まで病院で、片頭痛〔または〕緊張型頭痛〔または〕群発頭痛などと言われたことがありますか？	内科（神経内科）
7y06	頭痛が続いていますか？	内科
7y07	いつもの頭痛と同じですか？	内科
7g01	常用薬が切れた：お手もとに頭痛薬（市販も含む）はありませんか？〔あるいは〕切りましたか？	内科（神経内科）
7w01	【上記の全てに該当しない場合（適宜医師に助言を求める）】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1201	高齢者（65歳以上）か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

8 胸が痛い

電話相談	センテンス	選定科
8r01	胸痛[または]絞扼感(胸が締め付けられる感じ)[または]圧迫感(押される感じ)[または]不快感(胸がもやもやする感じ)[または]胸が裂けるような痛みがありますか？	
8r02	頸部(首)[または]あご[または]肩甲骨[または]背中[または]上肢(腕)に放散する痛みがありますか？	
8r03	息切れ[または]めまい[または]脱力感(力が入らない)がありますか？	
8r04	手足が冷たい[または]湿っている/じっとりしていますか？	
8r05	嘔吐[または]吐き気 がありますか？	
8r06	安静にしても胸が痛いですか？	
8r07	動悸(ドキドキする感じ)[または]脈がとぶ感じ がありますか？	
8r08	処方されている薬(ニトログリセリン、フランドルテープなど)を使っても胸痛がおさまらないですか？	
8r09	長時間座位/長く座りっぱなし[または]同じ姿勢[または]旅行などの後ですか？	
8r10	心臓の病気をされたことがありますか？[または]いつもの発作と違いますか？	
8r11	ピル/避妊薬を飲んでいますか？	
8r12	足の痛み、腫れ、むくみ、赤味、熱っぽい感じのいずれかがありますか？	
8r13	急に足首が腫れてきましたか？	
8r14	血の混じった痰が出てきましたか？	
8r15	けが、事故、妊娠、出産、手術、血液の病気(血液凝固異常)のいずれかを指摘されたことがありますか？	
8r16	血が止まりにくいですか？	
8y01	最近、外傷の既往があり[かつ]体動によって痛みが増しますか？	整形外科・外科
8y02	深呼吸[または]咳によって痛みますか？	内科(循環器内科)
8y03	その場所を圧迫すると痛みが出現しますか？	整形外科・外科
8y04	痛みの部分がはっきりしていますか？	整形外科・外科
8y05	発熱はありますか？	内科
8y06	咳[または]黄色～緑色の痰が出ていますか？	内科
8g01	以上の項目に当てはまらないとき	科目なし

1203	高齢者(65歳以上)か？[または]小児(15歳以下)か？[または]妊婦か？	→選出した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	
1204	糖尿病があるか？	
1205	慢性腎不全があるか？	
1206	喫煙歴があるか？	
1207	高血圧があるか？	

9 背中が痛い

電話相談	センテンス	選定科
9r01	突然の痛みで、強くなっていますか？(年齢を問わない)	
9r02	胸の痛みがありますか？	
9r03	急に足がしびれましたか？[または]足のだるさ(下肢の脱力)が強くなっていますか？[または]足を動かせませんか？	
9r04	強く痛む場所が移動しますか？	
9r05	裂けるような痛みがありますか？	
9r06	赤い尿が出ましたか？[かつ]尿をするときに激しい痛みはありますか？	
9r07	便や尿が漏れますか？(失禁)	
9r08	吐き気はありますか？[または]吐きましたか？[または]発熱はありますか？	内科
9y01	尿は出にくいですか？[または]トイレに行っても出ませんか？(長時間の排尿障害)	内科・泌尿器科
9y02	頻繁にトイレに行きますか？[または]尿をするときに痛みはありますか？	内科・泌尿器
9y03	長時間座位/長く座りっぱなし[または]同じ姿勢[または]旅行などの後に突然痛み出しましたか？	内科
9y04	お尻(腰)から足へ響く痛みがありますか？	整形外科
9y05	歩きにくいですか？	整形外科
9y06	痛み止めが効かないですか？	内科・整形外科
9y07	2日くらいの間にけがをしましたか？[または]事故にありましたか？	外科・整形外科
9y08	癌や糖尿病に罹っていますか？[または]治療中ですか？	内科(かかりつけ)
9y09	最近、体重が減っていますか？	内科
9g01	慢性の背部痛、背部の何らかの手術、腎結石、腎疾患のいずれかの既往がありますか？	科目なし
9g02	背中以外に(放散しない)痛みがありますか？[または]体の動き(体動)を妨げない程度の軽度の痛みがありますか？	科目なし
9g03	発熱はありますか？	科目なし
9w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1203	高齢者(65歳以上)か？[または]小児(15歳以下)か？[または]妊婦か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	
1207	高血圧がありますか？	

10 成人の発熱(16歳以上)

電話 相談	センテンス	選定科
10r01	起き上がることができないですか？	
10r02	強い頭痛と嘔吐がともにありますか？	
10r03	暑い所にしばらくいましたか？[または]激しい運動をした後ですか？[かつ]39℃以上の発熱がありますか？	
10r04	頭痛があり、意識がもうろうとしていますか？[または]意識状態が悪いですか？	内科
10y01	皮膚や唇が乾いていますか？(脱水徴候)	
10y02	喉がとても渴きますか？(脱水徴候)	
10y03	尿量が減ったり、尿の色が濃くなったりしていますか？(脱水徴候)	
10y04	立ちくらみが起きましたか？(脱水徴候)	
10y05	背中や脇腹に痛みがありますか？	
10y06	暑いところにしばらくいましたか？[または]激しい運動の後ですか？	
10y07	頭痛がありますか？	
10y08	飲み込みにくいですか？[または]喉に痛みがありますか？	内科
10y09	汚い痰、黄色～緑色の痰(膿性痰)が出ますか？	内科
10y10	熱があり、解熱薬が効かないですか？	内科
10y11	腹痛がありますか？	内科
10y12	吐き気はありますか？	内科
10y13	「大きな病気」(免疫不全を引き起こす基礎疾患:心臓疾患・肝臓病・糖尿病・ステロイド常用・癌・その他の感染症など)を治療中ですか？	内科(かかりつけ)
10y14	3日続く発熱がありますか？ 熱はどのくらい続いていますか？	内科
10y16	全身(体の広い範囲)が赤くなっていますか？[または]発疹(体が赤くなっていたり、蕁麻疹のようにブツブツが出ている)がありますか？	内科
10y17	下痢がありますか？	内科
10y19	最近、手術を受けましたか？	外科(かかりつけ)
10y21	(女性のみ) 妊娠中ですか？[または]出産後ですか？	産婦人科
10g01	尿をするときに痛みがありますか？	内科・泌尿器科
10g02	耳の痛みはありますか？	耳鼻咽喉科
10g03	(女性のみ) 膣(陰部)の痛み[または]おりものがありますか？	産婦人科
10g04	以上の項目に当てはまらないとき。	内科

1201	高齢者(65歳以上)か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

11 腹痛

電話 相談	センテンス	選定科
11r01	痛みは急にきましたか？[または]強い痛み(激痛)がずっと続いていますか？	
11r02	胸や背中中の痛みを伴いますか？	
11r03	吐いたものに血が混じっていますか？	
11r04	便に血が混じっていますか？(下血・血便) [または] 便の周りに血がついているようですか？	
11r05	(男性のみ) 陰嚢は腫れていますか？	
11y01	だんだん強くなっていますか？	内科(消化器科)
11y02	強くなったり弱くなったりしながら、今も痛みが続いていますか？	内科(消化器科)
11y03	何か吐きましたか？[または]吐き気はありますか？	内科(消化器科)
11y04	発熱(38℃以上)はありますか？	内科(消化器科)
11y05	下痢はありますか？	内科(消化器科)
11y06	鼠径部(足の付け根)にしこりを触れますか？	外科
11y07	(女性のみ)妊娠中ですか？	産婦人科
11y08	立ちくらみが起きましたか？(脱水徴候)	内科(消化器科)
11y09	(弱い腹痛で)最近おなかの手術を受けましたか？	外科(かかりつけ)
11y10	(弱い腹痛で)最近おなかにけがをしたり、大きな力を受けたりしましたか？	外科
11y11	腰や背中にも(弱い)痛み(腰背部痛)がありますか？	内科(消化器科)
11y12	便秘はありますか？	内科(消化器科)
11y13	(女性のみ)生理中ですか？	産婦人科
11y14	性器(陰部)の出血がありますか？	男性:泌尿器科、女性:産婦人科
11g01	同様の腹痛がよく起こりますか/同じような痛みがよく起こりますか？	内科(消化器科)
11w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1201	高齢者(65歳以上)か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

12 吐き気・吐いた

電話 相談	センテンス	選定科
12r01	吐いたものに血が混じていますか？	
12r02	強い吐き気[または]嘔吐が2日以上も続いていますか？	
12r03	強いおなかの痛み(腹痛)がありますか？	
12r04	おなかがパンパンに張って(腹部膨満)いますか？	
12r05	胸[または]背中中の痛みがありますか？	
12r06	ごく最近、頭・胸・腹にけがをしたり、大きな力を受けたりしましたか？	
12r07	強い頭痛を伴っていますか？	
12y01	だんだん強くなっていますか？	内科(消化器科)
12y02	頻繁に下痢はありますか？	内科(消化器科)
12y03	尿量が減ったり、尿の色が濃くなったりしていますか？(脱水徴候)	内科
12y04	皮膚や唇が乾いていますか？(脱水徴候)	内科
12y05	喉がとても渇きますか？(脱水徴候)	内科
12y06	立ちくらみが起きましたか？(脱水徴候)	内科
12y07	発熱(38℃以上)はありますか？	内科
12y08	吐き気[または]嘔吐は、強くなったり弱くなったりしながら続いていますか？	内科(消化器科)
12y09	(女性のみ)妊娠中ですか？[または]妊娠の可能性がありますか？	産婦人科
12y10	最近、外食、生もの、保存状態のよくない食品などを食べましたか？	内科(消化器科)
12g01	同じような症状をよく起こしますか？	内科(消化器科)
12w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1201	高齢者(65歳以上)か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

13 めまい・ふらつき

電話 相談	センテンス	選定科
13r01	動けませんか？ / 歩行や移動ができませんか？	
13r02	急に手足の力が抜けた感じ[または]手足の動きにくさがありますか？	
13r03	下痢[または]嘔吐 をしていますか？	
13r04	吐き気がありますか？	
13r05	しゃべりにくいですか？[または]しゃべりにくそうですか？	
13r06	高血圧の治療中ですか？[または]高血圧と言われたことがありますか？	
13r07	目が見えにくいですか？	
13r08	脈が極端に速かったり遅かったり、乱れたりしますか？[または]ドキドキしますか？	
13r09	胸の痛みがありますか？	
13r10	めまいの症状はひどいですか？	
13r11	頭痛がありますか？	脳神経外科・内科
13y01	ここ2日以内に、けがをしましたか？	脳神経外科
13y02	糖尿病と言われたことがありますか？	内科(かかりつけ)
13y03	耳が聞こえにくいですか？[または]耳鳴りがしますか？[または]耳の痛みがありますか？	耳鼻咽喉科
13y04	発熱はありますか？	内科
13y01	以上の項目に当てはまらないとき。	基本的に内科。以前にかかったことがあるなら耳鼻咽喉科・神経系の科でもよい

1203	高齢者(65歳以上)か？[または]小児(15歳以下)か？[または]妊婦か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

14 しびれ

電話 相談	センテンス	選定科
14r01	足(下肢)を挙げるできませんか？	
14r02	左右の両腕を並行に伸ばして、そのままにするよう指示しても、下がってしまいますか？	
14r03	手を挙げるできませんか？	
14r04	半身のしびれがありますか？	
14r05	足を挙げてそのままにしても、下がってしまいますか？	
14r06	頭痛がありますか？	
14r07	眼がかすむ[または]視界がぼやける状態がありますか？	
14r08	他と比べて手他と比べて手や足の指先が冷たい[または]色が悪いですか？や足の指先が冷たい、または、色が悪い。	
14r09	「今日はいい天気です」と繰り返して言うように指示しても、呂律が回っていない[または]どこか異常に感じますか？	
14r10	「今日はいい天気です」と繰り返して言うように指示しても、無言、黙っている[または]理解していませんか？	
14r11	めまい[または]吐き気[または]嘔吐がありますか？	脳神経外科・内科(神経内科)
14y01	耳が聞こえにくいですか？[または]耳鳴りがしますか？	脳神経外科・内科(神経内科)
14y02	高血圧の治療中ですか？[または]高血圧と言われたことがありますか？	脳神経外科・内科(神経内科)
14y03	しびれが我慢できない[または]強い痛みを伴っていますか？	整形外科
14y04	最近重量物を持ち上げた[または]過度の運動をしましたか？	整形外科
14y05	首が重たい、こるような感じ、痛いいずれかの症状がありますか？	脳神経外科・内科(神経内科)
14y06	息が荒い、めまい、手または顔、唇が震える、しびれるのいずれかの症状がありますか？	内科
14g01	しびれ以外の症状はありませんか？	内科
14w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1202	歩行不能か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1208	出血性素因 [または] 過去に血が止まりにくい [または] 抗凝固薬などの服用があるか？	

15 腰痛

電話 相談	センテンス	選定科
15r01	痛みが強くて動くことができませんか？/自力で病院を受診することができませんか？	
15r02	突然の痛みで強くなっていますか？	
15r03	強く痛む場所が移動しますか？	
15r04	急に足がしびれましたか？〔または〕足のだるさが強くなっていますか？〔または〕足を動かさせませんか？	
15r05	赤い尿が出ましたか？〔または〕尿をするとき激しい痛みはありますか？	
15r06	便や尿は漏れますか？（失禁）	
15y01	しりもちなどのけがの後に痛み出しましたか？	
15y02	熱はありますか？〔かつ〕嘔吐〔または〕吐き気はありますか？	内科
15y03	尿は出にくいですか？〔または〕トイレに行っても出ませんか？	内科・泌尿器科
15y04	重いものを持つなど、痛みが出たきっかけがありましたか？	整形外科
15y05	尿をするときに痛みがありますか？	内科・泌尿器科
15y06	腰を打った後に赤い尿が出ましたか？	外科・泌尿器科
15y07	腰から足へ響く痛みがありますか？	整形外科
15y08	歩きにくいですか？	整形外科
15y09	痛み止めが効かないですか？	整形外科
15y10	2日ぐらいの間に、けがや事故にあっていますか？	整形外科
15y11	癌や糖尿病に罹っていますか？〔または〕治療中ですか？	内科(かかりつけ)
15g01	もともと腰痛もち〔または〕腰の手術後ですか？	整形外科(かかりつけ)
15g02	軽度の痛み〔かつ〕移動可能〔または〕我慢できますか？	整形外科(かかりつけ)
15w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1203	高齢者(65歳以上)か？〔または〕小児(15歳以下)か？〔または〕妊婦か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	

16 何か固形物を飲み込んだ

電話 相談	センテンス	選定科
16r01	咳が出ていますか？（気道開放、呼吸を常に確認）	
16r02	いつも通りの息ができていますか？（Q6の再確認）	
16r03	喉[または]胸 が激しく痛みますか？	
16r04	血を吐きましたか？	
16r05	飲んだものに毒性がありそうですか？	
16r06	とがったものを飲んだようですか？（針、釘、びょう、ガラス、PTPなど）	外科・内科(消化器科)・耳鼻科
16y01	喉から異物が取れませんか？	外科・耳鼻科
16y02	嘔吐しましたか？[または]吐き気がありますか？	内科・外科・小児科
16y03	おなかが痛いですか？	外科・内科(消化器科)・小児科
16y04	ボタン型の電池を飲んだようですか？	内科・外科・小児科
16y05	飲んだものがわかりませんか？	内科・外科・小児科
16y06	1円玉より大きなものを飲んだようですか？	内科・小児科
16y07	喉に違和感が残っていますか？	内科・小児科
16g01	1円玉より小さなものを飲んだようですか？	内科・外科・小児
16g02	異物を飲み込んだが症状がまったくありませんか？	内科・小児科

1203	高齢者(65歳以上)か？ [または]小児(15歳以下)か？[または]妊婦か？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1202	歩行不能か？	
1208	出血性素因[または]過去に出血が止まりにくい[または]抗凝固薬などの服用があるか？	

17 小児の発熱(15歳以下)

電話 相談	センテンス	選定科
17r01	意識がもうろうとしていますか？〔または〕おかしなことを口走っていますか？	
17r02	1日中ウトウトしていますか？	
17r03	興奮していますか？〔または〕あばれていますか？	
17r04	ひどい頭痛がありますか？	小児科
17y01	38℃以上の発熱がある〔かつ〕3ヵ月未満ですか？	小児科
17y02	尿量が減ったり、尿の色が濃くなったりしていますか？（脱水徴候）	小児科
17y03	水分を十分にとれていないですか？	小児科
17y04	ひどい下痢がありますか？	小児科
17y05	吐き気はありますか？	小児科
17y06	皮膚や唇が乾いていますか？（脱水徴候）	小児科
17y07	ひどい腹痛がありますか？	小児科
17y08	何か特別な病気（ステロイド剤服用中、免疫不全、悪性腫瘍、先天性心疾患など）で病院にかかっている、熱が出たらすぐ病院に行くように言われていますか？	小児科
17y09	暑い所にしばらくいましたか？〔または〕激しい運動の後ですか？	小児科
17y10	発熱（38℃以上41℃未満）はありますか？（まだ病院を受診していなければ）	小児科
17y11	痰の絡んだ咳〔または〕黄色～緑色の鼻汁 がありますか？	小児科
17y12	耳を痛がりますか？	耳鼻咽喉科・小児科
17y13	耳の穴から膿が出ていますか/耳だれがありますか？	耳鼻咽喉科・小児科
17y14	尿が出るとき、痛がりますか？	小児科
17y15	全身が赤いですか？〔または〕発疹（体が赤くなっている〔または〕蕁麻疹のようにブツブツが出ている）はありますか？	小児科、皮膚科
17g01	以上の項目に当てはまらないとき。	小児科（かかりつけ）

1209	周囲で麻疹、溶連菌感染症などが流行っているか？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
1210	麻疹またはMRワクチン未接種で、麻疹未罹患か？	

18 小児の吐き気・吐いた(15歳以下)

電話 相談	センテンス	選定科
18r01	嘔吐を何度も繰り返していますか？（回数の目安：6回以上〔または〕吐物中に食物残渣がみられなくなっても2～3回以上嘔吐を繰り返している）	
18r02	吐いたものに血〔または〕胆汁（緑がかった液体）が混じっていますか？	
18r03	発熱(38℃以上)はありますか？	
18r04	尿が半日以上出ていませんか？（脱水徴候）	
18r05	無表情でウトウトしていますか？〔または〕元気がぐたっとしていますか？	
18r06	（乳児の場合）ミルク摂取後に、3～4回以上噴出する嘔吐がみられましたか？	
18r07	強いおなかの痛み（腹痛）がありますか？	
18r08	頭を激しく痛がっていますか？	
18r09	便に血液またはイチゴゼリー様のものが混じっていますか？	
18r10	おなかがパンパンに張っていますか？	
18r11	泣いても涙がほとんど出ないですか？（脱水徴候）	
18r12	おなかを強く打ちましたか？	
18y01	少しの水分をとらせても吐きますか？	小児科
18y02	だんだん吐き気が強くなってきていますか？	小児科
18y03	発熱はありますか？	小児科
18y04	尿量が減ったり、尿の色が濃くなったりしていますか？（脱水徴候）	小児科
18y05	頻繁に下痢がありますか？	小児科
18y06	皮膚や唇が乾いていますか？（脱水徴候）	小児科
18y07	咳がひどいですか？	小児科
18y08	現在、吐いてはいない〔または〕気持ち悪がっていますか？	小児科
18y09	家族・近所・保育園・幼稚園・学校などで同じような症状の人が多いですか？	小児科
18y10	一緒に食事をした人が、同様の症状を訴えていますか？	小児科
18y11	最近、外食・生もの・保存状態のよくない食品などを食べましたか？	小児科
18y12	便秘はありますか？	小児科(かかりつけ)
18g01	同じような症状を以前からよく起こしますか？	小児科(かかりつけ)
18w01	【上記の全てに該当しない場合(適宜医師に助言を求める)】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	


19 小児の頭のけが・首のけが(15歳以下)

電話 相談	センテンス	選定科
19r01	数回にわたる嘔吐（何回か吐いた）がありますか？	
19r02	片側の upper limb（腕）が挙上しない〔または〕反対側に比較して挙がらない〔または〕腕の上がり具合に左右差がありますか？	
19r03	サラサラした液体（髄液の可能性）が鼻〔または〕耳からポタポタと出ていますか？	
19r04	押さえても、鼻血が止まらないですか？〔または〕直接ぶつけていないのに耳出血がありますか？	
19r05	頭からの出血が多いですか（押さえても止まらないですか）？	
19r06	首をかしげる姿勢をとっていますか？〔または〕まっすぐ体を向かせても横を向いていますか？	
19r07	手足で動きにくいところがありますか？〔または〕しびれがありますか？	
19r08	受傷後に〔または〕受傷時に意識消失がありましたか？	
19r09	意識はしっかりしていますか？〔かつ〕頭痛を訴えていますか（頭が痛いと言っている）？	
19r10	めまいがありますか？	
19r11	眼が見えにくかったり、ものが二重に見えたりしますか？	
19r12	1回吐き〔かつ〕元気がないですか？	脳神経外科
19r13	同じことを何度も質問しますか？	脳神経外科
19r14	首の後ろをさわると痛がりませんか？	脳神経外科
19y01	起こせば起きるが、元気ありませんか？	脳神経外科
19y02	頭部から出血していたが、止まった〔または〕圧迫止血で止まっていますか？	脳神経外科
19y03	発熱（38℃以上）はありますか？	脳神経外科
19y04	1回吐いたが〔かつ〕その後は普通ですか？	脳神経外科
19y05	（大きな）こぶがある〔かつ〕普段と様子に変わりはないですか？	脳神経外科
19g01	普段ととくに変わった様子はない（37℃台の微熱を含む）ですか？	脳神経外科
19g02	受傷後、すでに2日（48時間）経っているが、心配で電話しましたか？	脳神経外科
19w01	【上記の全てに該当しない場合（適宜医師に助言を求める）】 現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合、変わらず続く場合、他の症状が出現した場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。	

1208	出血性素因〔または〕過去に血が止まりにくい〔または〕抗凝固薬などの服用があるか？	→選択した緊急度をさらに上げることを考慮する。または医師に助言を求める。
------	--	--------------------------------------

119番通報プロトコル

【119番アルゴリズム】



※ 救急隊到着後に出勤形態を“down sizing”してもよい

119番通報からの導入 緊急度分類（119番プロトコル）

質問の目的	質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
(導入)	1		火事ですか、救急ですか？				
			a	救急			
(出動先確認)	2		(救急車が出動する先の住所、電話番号の確認)			(→対象外)	事前に把握できれば省略可
(概況の把握)	1		どなたが、どうしましたか？				
			a	<キーワード> 呼吸なし・脈なし・水没・冷たく・首をつった・首を絞めた		→○出動指示	
			b	(キーワードなしで) 外因性・外傷(交通外傷、転落、熱傷、咬傷など)			蛇などによる咬傷は、外傷を選択。(中毒ではない)
			c	(キーワードなしで) けいれん		→●「6. けいれん」へ	
			d	主訴の分類 (胸が痛い、背中が痛いなど)		<主訴の選択>	
(多数傷病者の否定)	2		(複数の傷病者が疑われるとき・曖昧な時)怪我をしたのは(病気なのは)何人ですか？				
			a	一人			
(通報者の確認)	3		(本人からの通報ではない時、通報者が不明な時) 通報しているあなたは、どなた(家族の方、警察官の方)ですか？				
			a	本人			
			b	本人以外 (① 家族、②警察官、③通行人、④福祉施設、⑤その他、⑥不明)			
(年齢の確認)	4		(ここまでで不明な場合) 年齢は、いくつぐらいですか？				
			a	①4歳以下(乳幼児)、②5-14歳(小児)、③15-39歳(青年)、④40-69歳(壮年)、⑤70歳以上(高齢)、⑥85歳以上(超高齢)			
(性別の確認)	5		(ここまでで不明な場合) 患者は、男性(男の子)ですか、女性(女の子)ですか？				
			a	男			
			b	女			
(観察の可否の確認)	4		今、直接、患者をみることができますか？(目の前にいますか？など)				
			a	容態を観察している・観察した			
			b	容態を観察していないし、観察できない		→「電話を切らないで」「すぐに言って見てください」「電話を持ったまま近づいて」	
			(見に行くことできなければ)		→○出動指示		

(呼吸の確認)	5	呼吸は楽にしていますか？普段通りの呼吸ですか？				
		a	はい			
		b	いいえ(呼吸なし)	→○出動指示		
		c	いいえ(死戦期呼吸を疑う)	→○出動指示		
		d	いいえ(いびき)			
		e	いいえ(窒息)	→○出動指示		
		f	呼吸が苦しそう			
		g	不明			
(循環の確認)	6	冷や汗をかいていますか？				
		a	はい	→○出動指示		
		b	いいえ			
		c	不明			
(顔色の確認)	7	1	顔色は悪いですか？			
			a	悪い	→○出動指示	
			b	悪くない(いつもと同じ、赤色)		
		c	不明			
(意識の確認)	8	1	普通に話しができますか？			8-1の質問への通報者の返答によって、a-gに振りわける。「いいえ」のみの返答の際には、fを選択する。bからeに振り分けるための追加の質問は不要
			a	はい		
			b	いいえ(つじつまが合わない)	→○出動指示	
			c	いいえ(単語しか話せない)	→○出動指示	
			d	いいえ(うめき声のみ)	→○出動指示	
			e	いいえ(声が全く出ない)	→○出動指示	
		f	いいえ(内容不明)	→○出動指示		
(呼吸の詳細確認)			g	いいえ(意識は問題がないが、呼吸苦で話しができない)	→○出動要請	
			i	不明	→○出動指示	
(症候別へ)	9	それでは、()について、もう少しお聞きします。→主訴分類に応じて症候別インタビューへ				

症候別 緊急度分類 (119番プロトコル)

1.2.3.	症状	呼吸困難
症状例	「息が苦しい」、「呼吸が苦しい」、「息苦しい」、「肩で息をしている」、「息ができない」、「ゼーゼーいつている」、「ヒューヒューいつている」、「息をするときに音がする」、「痰(たん)がからんだような音がする」、「喘息なんですけど・・・」など	

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1	1	喘息の持病はありますか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
	2	(1-1が「はい」の場合) 吸入薬を持っていますか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
	3	(1-2が「はい」の場合) それを使用しましたか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
2	1	(在宅医療に関係する呼吸苦の場合) ※気管切開や人工呼吸など このような状況での特別な機器の使用や指示を、かかりつけの医師から受けていますか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
	2	(「はい」の場合) それを行いましたか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	Q	呼吸が切迫している状態	(意識の確認)でgの場合
赤	Q	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	呼吸苦がある状態	いずれにも当てはまらない場合

症候別 緊急度分類（119番プロトコル）

4	症状	動悸
症状例		「どきどきする」、「胸がどきどきする」、「動悸がする」

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き	
1	1	これまで心臓の異常を指摘されたことがありますか？	a	はい		ここでいう「心臓の異常」は、「心不全」、「狭心症」、「心筋梗塞」、「(大動脈弁狭窄などの)弁疾患」などと具体的に「診断」をうけたもの言う。単に検診で指摘され無治療の「不整脈」、「不整脈の気」などは含まない	
			b	いいえ			
			c	不明			
	2	(1-1で「体内式埋め込み型除細動器」が植え込みが確認された場合) 30分以内に体内式埋め込み型除細動器は、発動しましたか？	a	はい			※体内式埋め込み型除細動器は、頻脈性不整脈(早い脈拍)を制御するために電気ショックを与え、正常なリズムに戻すために作られた機器である。
			b	いいえ			
			c	不明			
2	胸痛はありますか？	a	はい				
		b	いいえ				
		c	不明				
3	12時間以内に、何か薬を使用しましたか？	a	はい				
		b	いいえ				
		c	不明				
4		(これまでに蘇生直後 かつ/またはAEDによる除細動後が行われたことが疑われる場合) 心肺蘇生やAEDによる除細動を行いましたか？	a	はい			
			b	いいえ			

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	Q	呼吸が切迫している状態	(意識の確認)でgの場合
赤	Q	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	Q	蘇生直後 かつ/またはAEDによる除細動後の状態	(概況の把握)で、蘇生直後 かつ/またはAEDによる除細動後が行われたことが聴取された場合
赤	R	体内式埋め込み型除細動器」の発動後の状態	質問1-2でaの場合
赤	R	呼吸苦がある状態	(呼吸の確認)でf、dの場合
赤	R	40歳以上で胸痛のある状態	(年齢の確認)で40以上で、質問2でaの場合
赤	R	心疾患の病歴のある状態	質問1-1でaの場合
赤	R	状況が不明な心疾患、他に該当しない心疾患	いずれにも当てはまらない場合
黄色	2	40歳未満の胸痛	(年齢の確認)で40以下の場合

症候別 緊急度分類 (119番プロトコル)

5	症状	意識障害
症状例		「反応がない」、「意識がないようだ」、「変なことを言う」、「うわごとを言っている」、「いつもと様子が違う」、「気を失った」、「気を失いかけた」など

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	注意書き		
1	1	(呼吸、意識の状態から、呼吸停止の可能性が否定できない場合) それでは、今から傷病者をみて、呼吸をする度に私に合図してください。					
		a	10秒以上(死戦期呼吸)	→○出動指示			
		b	10秒未満				
		c	実施できず				
2	1	(119番の導入での意識の確認で、「はい」(普通に話しができる)のときのみ) 現在も、会話が可能な状態のままですか？				8-1の質問への通報者の返答によって、a-gにふりわけられる。「いいえ」のみの返答の際には、fを選択する。bからeに振り分けるための追加の質問は不要	
		a	はい				
		b	いいえ(つじつまが合わない)	→○出動指示			
		c	いいえ(単語しか話せない)	→○出動指示			
		d	いいえ(うめき声のみ)	→○出動指示			
		e	いいえ(声が全く出ない)	→○出動指示			
		f	いいえ(内容不明)	→○出動指示			
	g	不明	→○出動指示				
	2		(2-1で「はい」のみ) これまで心臓の異常を指摘されたことがありますか？				
			a	はい			
	3		(2-1で「はい」のみ)(12才~50才の女性の場合)お腹を痛がっていますか(したか)？				
			a	はい			
				b	いいえ		

緊急度	コード	決定因子	
赤	P	死戦期呼吸を疑う状態	質問1-1でaの場合
赤	Q	意識が清明でなく、かつ、呼吸に異常のある状態	(意識の確認)か質問2-1でb-fで、かつ、(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	Q	意識が清明でなく、かつ、顔色に異常のある状態	(意識の確認)か質問2-1でb-fで、かつ、(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	意識が清明でなく、かつ、冷や汗を伴った状態	(意識の確認)か質問2-1でb-fで、かつ、(循環の確認)でaの場合
赤	Q	意識が清明でなく、かつ、呼吸・循環状態が正常の状態	(意識の確認)か質問2-1でb-fで、かつ、(呼吸の確認)(顔色の確認)(循環の確認)で異常がない場合
赤	Q	意識が清明でなく、かつ、呼吸・循環状態が不明な状態	(意識の確認)か質問2-1でb-fの場合
赤	R	今は意識清明であるが、呼吸に異常のある状態	(意識の確認)か質問2-1でaで、かつ、(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	R	今は意識清明であるが、顔色に異常のある状態	(意識の確認)か質問2-1でaで、かつ、(顔色の確認)でaの場合
赤	R	今は意識清明であるが、冷や汗を伴った状態	(意識の確認)か質問2-1でaで、かつ、(循環の確認)でaの場合
赤	R	40才以上で今は意識清明であるが、心疾患の既往がある状態	(意識の確認)か質問2-1でaで、かつ、(年齢の確認)で40以上で、質問2でaの場合
赤	R	今は意識清明であるが、12-50才の女性で腹痛を伴った状態	(意識の確認)か質問2-1でaで、かつ、(年齢の確認)で12-50で、質問3でaの場合
黄色	1	40才以上で今は意識清明であり、心疾患の既往もない状態	(意識の確認)か質問2-1でaで、かつ、(年齢の確認)で40以上で、質問2でbの場合
黄色	2	39才までで今は意識清明であるが、心疾患の既往がある状態	(意識の確認)か質問2-1でaで、かつ、(年齢の確認)で39以下で、質問2でaの場合
黄色	3	39才までで今は意識清明であり、心疾患の既往もない状態	(意識の確認)か質問2-1でaで、かつ、(年齢の確認)で39以下で、質問2でbの場合

症候別 緊急度分類（119番プロトコル）

6	症状	けいれん(痙攣)
症状例		「ひきつけ」、「てんかん」、「がたがた震えている」、「泡を吹いている」、「白目をむいている」、「けいれんを起こしている」など

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	注意書き	
1		痙攣を繰り返していますか？				
		a	はい			
		b	いいえ			
2		(女性で12～50才の場合)妊娠していますか？				
		a	はい			
		b	いいえ			
		c	不明			
3		糖尿病と言われたことがありますか？				
		a	はい			
		b	いいえ			
		c	不明			
4		これまで、痙攣やてんかん(癲癇)を起こしたことがありますか？				
		a	はい			
		b	いいえ			
		c	不明			
5	1	(全身性の痙攣の場合が疑われる場合)				
		けいれんは続いていますか？				
		a	はい	→○出動指示		
		b	いいえ			
	2	(5-1が「いいえ」の場合)				
		いま、呼吸をしていますか？				
		a	はい			
		b	いいえ	→○出動指示		
	3	(5-2が「はい」もしくは「不明」の場合) それでは、今から傷病者をみて、呼吸をする度に私に合図してください。				
		a	10秒以上(死戦期呼吸)	→○出動指示		
b		10秒未満				
c		実施できず				
6	1	(局所性の痙攣の場合が疑われる場合)				
		いま、意識ははっきりしていますか？(受け答えに問題がないか)				
		a	はい			
	2	(6-1が「いいえ」の場合)				
		いま、呼吸をしていますか？				
		a	はい			
		b	いいえ	→○出動指示		
	3	(6-2が「はい」もしくは「不明」の場合) それでは、今から患者をみて、呼吸をする度に私に合図してください。				
		a	10秒以上(死戦期呼吸)	→○出動指示		
		b	10秒未満			
c		実施できず				
7		(まだ、痙攣が起きていないが、今後、痙攣の発生が予想される場合)				
		まだ痙攣が起きていないが、今後起きる感じがするのですか？				
	a	はい				
	b	いいえ				

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	呼吸停止の状態(質問後に判明した)	質問5-2でbまたは質問6-2でbの場合
赤	Q	継続している状態、もしくは繰り返す状態、もしくは継続しているかどうか不明な状態	質問1でaまたは質問5-1でaまたはcの場合
赤	Q	死戦期呼吸を疑う状態	質問5-3でaの場合
赤	Q	40才以上で、呼吸状態が不明な状態	(年齢の確認)で40以上でかつ質問5-2または質問6-2でcの場合
赤	R	意識が清明でない局所的な痙攣の状態	質問6-1でbの場合
赤	R	妊娠に関連した痙攣(すでに停止した状態)	質問2でaの場合
赤	R	糖尿病に関連した痙攣(すでに停止した状態)	質問3でaの場合
赤	S	39才までで、呼吸状態が不明な状態	(年齢の確認)で39以下でかつ質問5-2または質問6-2でcの場合
黄色	1	痙攣が停止しており、呼吸に異常を認めない状態	質問5-1でbでかつ質問5-2でaの場合
黄色	2	意識が清明で、局所的な痙攣の状態	質問6-1でaの場合
黄色	3	今後、痙攣の発生が予測される状態	質問7でaの場合

症候別 緊急度分類 (119番プロトコル)

7	症状	頭痛
症状例		「頭が痛い」、「後頭部が痛い」、「頭痛がすると言って倒れた」など

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	注意書き	
1		(119番の導入プロトコルの意識の確認で、「a」の場合のみ) 言葉ははっきりとしていますか？(はっきりしゃべっていますか？)	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
2		激しい痛みが、突然起こりましたか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
3		痛みはいつ始まりましたか？	a	1時間以内		
			b	2時間以内		
			c	3時間以内		
			d	6時間以内		
			e	12時間以内		
			f	24時間以内		
			g	それ以上		
			h	不明		
4		しびれや麻痺がありますか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
5		何か、いつもと違う振る舞いがありますか？(3時間以内)	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
6	1	(8才以上であれば)状況を確認するため、傷病者と直接、話すことができますか？	a	はい		
			b	いいえ		
	2		(「はい」の場合、話しをした結果)	a	正常	
				b	異常	

緊急度	コード	決定因子	
赤	R	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合の場合、または、質問6-2でbの場合
赤	R	呼吸に異常のある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	R	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	R	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	言語障害のある状態	質問1でbの場合
赤	R	突然の激しい頭痛を伴う状態	質問2でaの場合
赤	R	しびれ・麻痺のある状態	質問4でaの場合
赤	R	いつもと違う振る舞いのある状態	質問5でaの場合
赤	S	不明な状態、他に該当しない状態	いずれに当たらない場合
黄色	1	呼吸・循環が正常で、かつ、患者本人と直接話しができなかった状態	(呼吸の確認)でaかつ(顔色の確認)bかつ(循環の確認)でbかつ質問6-1でbの場合
緑	1	呼吸・循環が正常で、かつ、患者本人と直接話しができた状態	(呼吸の確認)でaかつ(顔色の確認)bかつ(循環の確認)でbかつ質問6-1でaかつ質問6-2でaの場合

症候別 緊急度分類 (119番プロトコル)

8	症状	胸痛(非外傷性)
症状例		「胸が痛い」、「胸が苦しい」など

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	注意書き
1		吐いたり、吐き気がありませんか？	a	はい	
			b	いいえ	
			c	不明	
2	1	これまで、心筋梗塞や狭心症と言われたことがありますか？	a	はい	
			b	いいえ	
			c	不明	
	2	これまで、同様の痛みが何度かありましたか？	a	はい	
			b	いいえ	
			c	不明	

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	Q	呼吸に異常がある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	Q	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	Q	嘔気・嘔吐を伴った状態	質問1でaの場合
赤	R	心筋梗塞や狭心症の既往のある状態	質問2-1でaの場合
赤	R	これまでも胸痛の経験のある状態	質問2-2でaの場合
赤	R	40才以上で、呼吸・循環の正常な状態	(年齢の確認)で40以上の場合
黄色	1	39才までで、呼吸・循環の正常な状態	(年齢の確認)で39までの場合

症候別 緊急度分類 (119番プロトコル)

9	症状	背部痛
症状例		「背中が痛い」、「背骨が痛い」など、「腰がいたい」、「腰痛がひどい」

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1		その症状はいつからですか？				
		a	a	6時間未満		
		b	b	6時間以上		
2		体をぶつけたり、高いところから落ちたりしましたか？				
		a	a	外傷性		
		b	b	非外傷性		※外傷が原因ではない痛み
3		(「119番導入プロトコル」の呼吸の確認で、「a,g,h」の場合) 再度確認しますが、息苦しくないですか？、呼吸が苦しそうですか？				
		a	a	はい	→●(呼吸苦へ)	
		b	b	いいえ		
4		(女性45才以上、男性40才以上)胸は痛くないですか？				
		a	a	はい	→●(胸痛へ)	
		b	b	いいえ		
5		これまでに大動脈瘤などを指摘されたことがありますか？				
		a	a	はい		
		b	b	いいえ		
	c	c	不明			
6		(50才以上の場合)気を失いそうになりましたか？				
		a	a	はい		
		b	b	いいえ		
	c	c	不明			
7		(50才以上の場合)どのような痛みか教えてください				
		a	a	さけるような痛み		
		b	b	移動する(上から下に、胸部から腹部に、背中(後ろ)から前(胸部)になど)		
		c	c	締め付けられる		
		d	d	重苦しく		
		e	e	ビリビリ		
		f	f	シクシク、ジクジク		
		g	g	拍動性		
		h	h	ズッキンズッキン		
		i	i	ドクドク		
		j	j	その他の痛み		
				<テキスト入力>		
8		歩けますか？				
		a	a	はい		
		b	b	いいえ		
	c	c	不明			

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	Q	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	大動脈瘤などの病歴のある状態	質問5でaの場合 胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤、大動脈解離などが含まれる
赤	R	50歳以上で、気を失った(失いかけた)状態	(年齢の確認)で50以上でかつ質問6でaの場合
赤	R	50歳以上で背部痛のある状態	(年齢の確認)で50以上の場合
黄色	1	非外傷性の背部痛を疑う状態	質問2でbの場合
黄色	2	外傷性で、時間が経過(6時間以上)した状態	質問2でaでかつ質問1でbの場合

症候別 緊急度分類（119番プロトコル）

10	症状	成人の発熱(16歳以上)
症状例		〇〇度の熱がでた。熱が高い。

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1		何か、いつもと違う振る舞いがありますか？	a	はい		意識レベルの細かい確認のため
			b	いいえ		
			c	不明		
2		傷病者はどこか痛がっていますか？	a	頭		→●(10.胸痛)
			b	顎		
			c	胸		
			d	腹		
			e	背中～腰		
			f	四肢(節々を含む)		
			g	全身		
			h	その他		
			i	いいえ		
			j	不明		
3		傷病者は血が出ていたり、血を吐いたりしていますか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
4		傷病者は歩けますか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	R	呼吸に異常がある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	R	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	R	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	いつもと違う振る舞いのある状態	質問1でaの場合
赤	S	状況が不明な状態/他の項目に該当しない状態	いずれにも当てはまらない場合
黄色	1	呼吸、循環、意識に異常を認めない状態	(意識の確認)でaかつ(呼吸の確認)でaかつ(顔色の確認)でbかつ(循環の確認)でbの場合

症候別 緊急度分類 (119番プロトコル)

11	症状	腹痛
症状例		「おなかが痛い」「みぞおちが痛い」「下腹が痛い」「わき腹が痛い」「おなかが張る」「足の付け根が痛い」

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	注意書き
1		これまでに大動脈瘤などを指摘されたことがありますか？	a	はい	
			b	いいえ	
			c	不明	
2		(女性で12歳以上の場合、男性50歳以上の場合) 気を失いそうになりましたか？	a	はい	
			b	いいえ	
			c	不明	
3		(40歳以上の男性、45歳以上の女性) 臍より上の痛みですか？	a	はい	
			b	いいえ	
			c	不明	
4		(50才以上の場合) どのような痛みか教えてください	a	さけるような痛み	
			b	移動する(上から下に、胸部から腹部に、背中(後ろ)から前(胸部)になど)	
			c	締め付けられる	
			d	重苦しく	
			e	ビリビリ	
			f	シクシク、ジクジク	
			g	拍動性	
			h	ズッキンズッキン	
			i	ドクドク	
			j	その他の痛み	
				<テキスト入力>	

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	Q	呼吸に異常がある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	Q	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	大動脈瘤などの病歴のある状態	質問1でaの場合、胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤、大動脈解離などが含まれる
赤	R	50才以上で、気を失った(失いかけた)状態	(年齢の確認)で50以上でかつ質問2でaの場合
赤	R	12才以上～50才未満の女性で、気を失った(失いかけた)状態	(年齢の確認)で12～50でかつ(性別の確認)でbでかつ質問2でaの場合
赤	R	40才以上の男性で、臍より上に腹痛を認める状態	(年齢の確認)で40以上でかつ(性別の確認)でaでかつ質問3でaの場合
赤	R	45才以上の女性で、臍より上の腹痛を認める状態	(年齢の確認)で45以上でかつ(性別の確認)でbでかつ質問3でaの場合
赤	R	50才以上で腹痛のある状態	(年齢の確認)で50以上の場合
黄色	1	他に当てはまらない腹痛	いずれにも当てはまらない場合
緑	1	男性15歳未満の腹痛	(年齢の確認)で15未満でかつ(性別の確認)でaの場合
緑	2	女性12歳未満の腹痛	(年齢の確認)で12未満でかつ(性別の確認)でbの場合

症候別 緊急度分類 (119番プロトコル)

12	症状	嘔気・嘔吐
症状例		「吐いた」、「吐き気が強い」など

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1		何か、いつもと違う振る舞いがありますか？	a	はい		意識レベルの細かい確認のため
			b	いいえ		
			c	不明		
2		傷病者はどこか痛がっていますか？	a	頭		→●(10.胸痛)
			b	顎		
			c	胸		
			d	腹		
			e	背中～腰		
			f	四肢(節々を含む)		
			g	全身		
			h	その他		
			i	いいえ		
			j	不明		
3		傷病者は血が出ていたり、血を吐いたりしていますか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	R	呼吸に異常がある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	R	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	R	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	いつもと違う振る舞いのある状態	質問1でaの場合
赤	S	状況が不明な状態/他の項目に該当しない状態	いずれにも当てはまらない場合
黄色	1	呼吸、循環、意識に異常を認めない状態	(意識の確認)でaかつ(呼吸の確認)でaかつ(顔色の確認)でbかつ(循環の確認)でbの場合

症候別 緊急度分類（119番プロトコル）

13	症状	めまい
症状例		「めまいがする」、「目が回る」など

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1		何か、いつもと違う振る舞いがありますか？				意識レベルの細かい確認のため
			a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		
2		傷病者はどこか痛がっていますか？				
			a	頭		
			b	頸		
			c	胸	→●(10.胸痛)	
			d	腹		
			e	背中～腰		
			f	四肢(節々を含む)		
			g	全身		
			h	その他		
			i	いいえ		
		j	不明			
3		傷病者は血が出ていたり、血を吐いたりしていますか？				
			a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	R	呼吸に異常がある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	R	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	R	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	いつもと違う振る舞いのある状態	質問1でaの場合
赤	S	状況が不明な状態/他の項目に該当しない状態	いずれにも当てはまらない場合
黄色	1	呼吸、循環、意識に異常を認めない状態	(意識の確認)でaかつ(呼吸の確認)でaかつ(顔色の確認)でbかつ(循環の確認)でbの場合

症候別 緊急度分類（119番プロトコル）

14	症状	しびれ
症状例	「手足がしびれている」 「脳卒中のようだ」、「脳卒中になった」 「突然、話しができなくなった」、「突然、片方の手（足）が動かなくなった」、「手（足）に力が入らなくなった」、「突然、バランスがとれなくなった」、「突然、目が見えなくなった」など	

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き	
1		(脳卒中の症状がまだ、聴取されていない場合)					
		なぜ、脳卒中だと思ったのですか？					
		a	急な言語障害				
		b	急な脱力または、しびれ（片側のみ）				
		c	急な麻痺または、顔面の左右差（片側のみ）				
		d	急なバランス感覚の欠如（ふらつきなど）				
		e	急な視覚障害				
		f	突然の頭痛				
2		これらの症状はいつからですか？（いつ始まりましたか？）					
		a	1時間以内				
		b	2時間以内				
		c	3時間以内				
		d	6時間以内				
		e	12時間以内				
		f	24時間以内				
		g	それ以上				
3		いままでに脳卒中になったことがありますか？					
		a	はい				
		b	いいえ				
		c	不明				

緊急度	コード	決定因子	
赤	R	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	R	呼吸に異常がある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	Q	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	急な言語障害を認めた状態	質問1でaの場合
赤	R	急な脱力または、しびれ（片側のみ）を認めた状態	質問1でbの場合
赤	R	急な麻痺または、顔面の左右差（片側のみ）を認めた状態	質問1でcの場合
赤	R	急なバランス感覚の欠如（ふらつきなど）を認めた状態	質問1でdの場合
赤	R	急な視覚障害を認めた状態	質問1でeの場合
赤	R	突然の頭痛を認めた状態	質問1でfの場合
赤	R	脳卒中の既往がある状態	質問3でaの場合
赤	R	40歳以上で、呼吸や循環に異常を認めない状態	(年齢の確認)で40以上でかつ(意識の確認)でaかつ(呼吸の確認)でaかつ(顔色の確認)でbかつ(循環の確認)でbの場合
赤	R	状況が不明な状態、他の項目に該当しない状態	いずれにも当てはまらない場合
黄色	1	40歳未満で、呼吸や循環に異常を認めない状態	(年齢の確認)で39まででかつ(意識の確認)でaかつ(呼吸の確認)でaかつ(顔色の確認)でbかつ(循環の確認)でbの場合

症候別 緊急度分類 (119番プロトコル)

15	症状	腰部痛
症状例		「背中が痛い」、「背骨が痛い」など、「腰がいたい」、「腰痛がひどい」

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1		その症状はいつからですか？				
		a	6時間未満			
		b	6時間以上			
2		体をぶつかけたり、高いところから落ちたりしましたか？				
		a	外傷性			
		b	非外傷性			※外傷が原因ではない痛み
3		(「119番導入プロトコル」の呼吸の確認で、「a,g,h」の場合) 再度確認しますが、息苦しくありませんか？、呼吸が苦しそうですか？				
		a	はい	→●(呼吸苦へ)		
		b	いいえ			
4		(女性45才以上、男性40才以上)胸は痛くないですか？				
		a	はい	→●(胸痛へ)		
		b	いいえ			
5		これまでに大動脈瘤などを指摘されたことがありますか？				
		a	はい			
		b	いいえ			
	c	不明				
6		(50才以上の場合)気を失いそうになりましたか？				
		a	はい			
		b	いいえ			
	c	不明				
7		(50才以上の場合)どのような痛みか教えてください				
		a	さけるような痛み			
		b	移動する(上から下に、胸部から腹部に、背中(後ろ)から前(胸部)になど)			
		c	締め付けられる			
		d	重苦しく、			
		e	ピリピリ			
		f	シクシク、ジクジク			
		g	拍動性			
		h	ズッキンズッキン			
		i	ドクドク			
		j	その他の痛み			
		<テキスト入力>				
8		歩けますか？				
		a	はい			
		b	いいえ			
	c	不明				

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	Q	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	大動脈瘤などの病歴のある状態	質問5でaの場合 胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤、大動脈解離などが含まれる
赤	R	50歳以上で、気を失った(失いかけた)状態	(年齢の確認)で50以上でかつ質問6でaの場合
赤	R	50歳以上で腰部痛のある状態	(年齢の確認)で50以上の場合
黄色	1	非外傷性の背部痛を疑う状態	質問2でbの場合
黄色	2	外傷性で、時間が経過(6時間以上)した状態	質問2でaでかつ質問1でbの場合

症候別 緊急度分類（119番プロトコル）

16	症状	固形物誤飲
症状例		「何か固形物を飲み込んだ」「食べ物などが喉につかえた」「喉に引っかかっている・取れない」など

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1		(意識清明、かつ呼吸正常の場合)話すこと(泣く)はできますか？				
			a	はい		
			b	いいえ	→○出動指示	
2		何を詰まらせたか？				
			a	<自由記載>		
			b	不明		

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	呼吸に異常を認め、部分閉塞を疑う状態	(意識の確認)でb-fの場合および質問1でbの場合
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	Q	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
緑	1	今は窒息していない(会話または泣いてる、意識あり、呼吸も正常)	質問1でaの場合

症候別 緊急度分類 (119番プロトコル)

17	症状	小児の発熱(16歳未満)
症状例		〇〇度の熱がでた。熱が高い。

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1		何か、いつもと違う振る舞いがありますか？	a	はい		意識レベルの細かい確認のため
			b	いいえ		
			c	不明		
2		傷病者はどこか痛がっていますか？	a	頭		
			b	顎		
			c	胸		
			d	腹		
			e	背中～腰		
			f	四肢(節々を含む)		
			g	全身		
			h	その他		
			i	いいえ		
			j	不明		
3		傷病者は血が出ていたり、血を吐いたりしていますか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	R	呼吸に異常がある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	R	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	R	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	いつもと違う振る舞いのある状態	質問1でaの場合
赤	S	状況が不明な状態/他の項目に該当しない状態	いずれにも当てはまらない場合
黄色	1	呼吸、循環、意識に異常を認めない状態	(意識の確認)でaかつ(呼吸の確認)でaかつ(顔色の確認)でbかつ(循環の確認)でbの場合

症候別 緊急度分類（119番プロトコル）

18	症状	小児の嘔気・嘔吐(16歳未満)
症状例		「吐いた」、「吐き気が強い」など

質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1		何か、いつもと違う振る舞いがありますか？	a	はい		意識レベルの細かい確認のため
			b	いいえ		
			c	不明		
2		傷病者はどこか痛がっていますか？	a	頭		
			b	顎		
			c	胸		
			d	腹		
			e	背中～腰		
			f	四肢(節々を含む)		
			g	全身		
			h	その他		
			i	いいえ		
			j	不明		
3		傷病者は血が出ていたり、血を吐いたりしていますか？	a	はい		
			b	いいえ		
			c	不明		

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	R	呼吸に異常がある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	R	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	R	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	R	いつもと違う振る舞いのある状態	質問1でaの場合
赤	S	状況が不明な状態/他の項目に該当しない状態	いずれにも当てはまらない場合
黄色	1	呼吸、循環、意識に異常を認めない状態	(意識の確認)でaかつ(呼吸の確認)でaかつ(顔色の確認)でbかつ(循環の確認)でbの場合

症候別 緊急度分類（119番プロトコル）

19	症状	小児の頭・頸部外傷
症状例		「頭をぶつけた」「落ちた」「頭から血が出た」など


質問番号	補足質問番号	質問内容	応答選択肢番号	応答選択肢	プロトコル移動先	注意書き
1		ひどい出血はありますか？				
			a	はい		
			b	いいえ		
2		いつ怪我をしましたか？				
			a	6時間未満		
			b	6時間以上		

緊急度	コード	決定因子	
赤	Q	意識が清明でない状態	(意識の確認)でb-fの場合
赤	Q	呼吸に異常がある状態	(呼吸の確認)でd,fの場合
赤	Q	顔色の変化のある状態	(顔色の確認)でaの場合
赤	Q	冷汗を伴った状態	(循環の確認)でaの場合
赤	S	大量出血を伴った状態	質問1でaの場合
赤	S	他に当てはまらない状態	いずれにも当てはまらない場合
黄色	1	6時間以上経過した状態	質問2でbの場合

救急現場プロトコル

【救急現場アルゴリズム】

※搬送資源の過不足を判断し、必要に応じて追加要請あるいは解除



症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	1	呼吸困難
651 息切れ	症状例	「息が苦しい」、「呼吸が苦しい」、「息苦しい」、「肩で息をしている」、「息ができない」、「ゼーゼーいっている」、「ヒューヒューいっている」、「息をするときに音がする」、「痰(たん)がからんだような音がする」、「喘息なんですけど…」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
		判定なし (該当なし)	O ₂ Sat >94%	
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≥120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したも)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状をおこしたも)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合. 特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
		判定なし	バイタルサイン正常	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C
特異項目	1.1	緑	息切れ、苦痛のある症状は認めない	
特異項目	1.2	赤2	起座呼吸	
特異項目	1.3	赤2	著明な喘鳴	
特異項目	1.4	赤2	胸痛	
特異項目	1.5	赤2	喀血(概ね100ml以上)	
特異項目	1.6	赤2	著明な浮腫	
特異項目	1.7	赤2	広範囲湿性ラ音・乾性ラ音	
特異項目	1.8	赤2	腎不全の人工透析治療中	
特異項目	1.9	赤2	心筋梗塞、弁膜症、心筋症の治療中	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	2	動悸
005 動悸・不整脈	症状例	「ドキドキする」、「動悸がする」、「脈が速い」、「脈がとぶ」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
			判定なし(該当なし)	O ₂ Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≧120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状をおこしたもの)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合. 特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
			判定なし バイタルサイン正常	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C
特異項目	4.1	赤2	心原性の胸痛	
特異項目	4.2	赤2	致死性不整脈の病歴	
特異項目	4.3	黄	急性発症、現在も持続している状態	
特異項目	4.4	緑	動悸の既往、現在は軽快している状態	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	3	意識障害
401 意識障害 751 薬物乱用・中毒 752 薬物過量摂取	症状例	「反応がない」、「意識がないようだ」、「変なことを言う」、「うわごとを言っている」、「いつもと様子が違う」、「気を失った」、「気を失いかけた」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
	判定なし	(該当なし)	O ₂ Sat >94%	
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≥120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状をおこしたもの)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である 場合、特にその患者の通常値とは異なっている場合	
	判定なし	バイタルサイン正常		
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし		GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C

特異項目	5.11	赤2	低血糖症状がある場合	
特異項目	5.12	赤2	不明の薬物	
特異項目	5.13	赤2	逃走の恐れがあるまたは安全が確保できない状態	
特異項目	5.14	赤2	自殺企図または明確な計画がある	
特異項目	5.15	黄	自殺念慮はあるが具体的計画のないもの	
特異項目	5.16	緑	薬物過量摂取	
特異項目	5.17	赤1	高度脱水(ショック状態を呈す)	
特異項目	5.18	赤2	項部硬直	
特異項目	5.19	赤2	頭痛	
特異項目	5.2	赤2	嘔吐	
特異項目	5.21	赤2	低酸素環境	
特異項目	5.22	赤2	高温/低温環境	
特異項目	5.23	赤2	毒性のある原因物質(毒物・医薬品(強酸・強アルカリ・石油製品・青酸化合物)・覚醒剤、麻薬・毒性のある植物・農薬・家庭用品(防虫剤・殺鼠剤等)・有毒ガス)	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

受傷機転	601	赤2	同乗者の死亡した車両事故	
	602	赤2	車外に放出された車両事故	
	603	赤2	車の高度な損傷を認める車両事故	
	604	赤2	車に轢かれた歩行者・自転車事故	
	605	赤2	5m以上もしくは30Km/H以上の車に跳ね飛ばされた歩行者・自転車事故	
	606	赤2	運転手が離れていたもしくは30Km/H以上のバイク事故	
	607	赤2	高所からの墜落(6m以上または3階以上を目安)	
	608	赤2	体幹部が挟まれた	
	609	赤2	機械器具に巻き込まれた	
			判定なし	該当なし

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	4	けいれん
405 けいれん	症状例	「ひきつけ」、「てんかん」、「がたがた震えている」、「泡を吹いている」、「白目をむいている」、「けいれんを起こしている」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
		判定なし	該当なし	O ₂ Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≥120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合。特にその患者の通常値とは異なっている場合	
		判定なし	バイタルサイン正常	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	該当なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C
特異項目	6.1	赤1	痙攣持続状態	
特異項目	6.2	赤2	痙攣停止直後の状態	
特異項目	6.3	黄	症状軽快、意識レベル正常	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	501	赤2	深在性:急性	スコア8~10
	505	黄	深在性:急性	スコア4~7
		判定なし	該当なし	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	5	頭痛
404 頭痛	症状例	「頭が痛い」、「後頭部が痛い」、「頭痛がするとと言って倒れた」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	OzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	OzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	OzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	OzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	OzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	OzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O2Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O2Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O2Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O2Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O2Sat 92 - 94%
			判定なし (該当なし)	O2Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR \geq 120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・め)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合. 特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
		判定なし バイタルサイン正常		
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C
特異項目	7.1	赤2	突然発症、激しい、これまでで最悪の頭痛	
特異項目	7.2	赤2	視力障害	
特異項目	7.3	赤2	視力障害および目の疼痛	
特異項目	7.4	緑	慢性・再発性の頭痛	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	501	赤2	深在性:急性	スコア8~10
	505	黄	深在性:急性	スコア4~7
	502	黄	深在性:慢性	スコア8~10
	509	黄	深在性:急性	スコア0~3
	506	黄	深在性:慢性	スコア4~7
	510	緑	深在性:慢性	スコア0~3
		判定なし (該当なし)		

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	6	胸痛(非外傷性)
003 胸痛(心原性) 004 胸痛(非心原性)	症状例	「胸が痛い」、「胸が苦しい」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
		判定なし	(該当なし)	O ₂ Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≥120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である 場合. 特にその患者の通常値とは異なっている場合	
		判定なし	バイタルサイン正常	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし		GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C

特異項目	8.1	赤2	胸痛(心原性)	
特異項目	8.2	赤2	他の重篤な胸痛(裂ける・引裂かれる感じ)	
特異項目	8.3	緑	胸痛(非心原性)	
特異項目	8.4	赤2	20分以上続く胸部痛・絞扼痛	
特異項目	8.5	赤2	背部の激痛	
特異項目	8.6	赤2	心電図上ST-T変化	
特異項目	8.7	赤2	心電図上の不整脈(多源性/多発性/連発PVC・RonT・VT等)	
特異項目	8.8	赤2	血圧の左右差	

【第2段階】

疼痛	501	赤2	深在性:急性	スコア8~10
	505	黄	深在性:急性	スコア4~7
	503	黄	浅在性:急性	スコア8~10
	502	黄	深在性:慢性	スコア8~10
	509	黄	深在性:急性	スコア0~3
	507	黄	浅在性:急性	スコア4~7
	506	黄	深在性:慢性	スコア4~7
	504	黄	浅在性:慢性	スコア8~10
	510	緑	深在性:慢性	スコア0~3
	511	緑	浅在性:急性	スコア0~3
	512	緑	浅在性:慢性	スコア<8
			判定なし	(該当なし)

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	7	背部痛
551 腰背部痛	症状例	「背中が痛い」、「背骨が痛い」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
			判定なし(該当なし)	O ₂ Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR ≥ 120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合. 特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
			判定なし バイタルサイン正常	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT > 38.0°C、< 36.0°C
	402	赤2	心拍数 > 90またはRR > 20	BT > 38.0°C、< 36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT > 38.0°C、< 36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT > 38.0°C、< 36.0°C

特異項目	9.1	赤2	しびれや麻痺の症状	
特異項目	9.2	赤2	しびれや麻痺の症状および直腸膀胱障害	
特異項目	9.3	緑	腰背部痛	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	501	赤2	深在性:急性	スコア8~10
	505	黄	深在性:急性	スコア4~7
	502	黄	深在性:慢性	スコア8~10
	509	黄	深在性:急性	スコア0~3
	506	黄	深在性:慢性	スコア4~7
	510	緑	深在性:慢性	スコア0~3
		判定なし	(該当なし)	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	8	成人の発熱
852 発熱	症状例	「熱が出た」「悪寒がする」「震えている」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O2Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O2Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O2Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O2Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O2Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O2Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O2Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O2Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O2Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O2Sat 92 - 94%
			判定なし	(該当なし)
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR \geq 120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合。特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
			判定なし	バイタルサイン正常
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C
特異項目	10.1	赤2	点状出血	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	9	腹痛
251 腹痛 301 側腹部痛(泌尿器)	症状例	「おなかが痛い」「みぞおちが痛い」「下腹が痛い」「わき腹が痛い」「おなかが張る」「足の付け根が痛い」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
		判定なし	(該当なし)	O ₂ Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≧120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である 場合. 特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
	判定なし	バイタルサイン正常		
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
	判定なし		GCS14-15、JCS0-1	
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C

特異項目	11.01	緑	慢性の軽度腹痛	
特異項目	11.02	緑	慢性の軽度側腹部痛	
特異項目	11.03	赤2	腹壁緊張または圧痛	
特異項目	11.04	赤2	腹膜刺激症状	
特異項目	11.05	赤1	高度脱水(ショック状態を呈す)	
特異項目	11.06	赤2	高度貧血	
特異項目	11.07	赤2	グル音消失	
特異項目	11.08	赤2	有響性金属性グル音	
特異項目	11.09	赤2	妊娠の可能性あるいは人工妊娠中絶後	
特異項目	11.1	赤2	吐下血	
特異項目	11.11	赤2	腹部の異常膨隆	
特異項目	11.12	赤2	頻回の嘔吐	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	501	赤2	深在性:急性	スコア8~10
	505	黄	深在性:急性	スコア4~7
	502	黄	深在性:慢性	スコア8~10
	509	黄	深在性:急性	スコア0~3
	506	黄	深在性:慢性	スコア4~7
	510	緑	深在性:慢性	スコア0~3
		判定なし	(該当なし)	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	10	嘔気・嘔吐(成人)
257 嘔気・嘔吐	症状例	「吐いた」「吐き気」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
			判定なし(該当なし)	O ₂ Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≧120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・め)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合。特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
			判定なし バイタルサイン正常	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C

特異項目	12.1	赤2	活動性の多量出血	
特異項目	12.2	黄	コーヒー残渣様吐物・下血	
特異項目	12.3	緑	慢性的な嘔吐・嘔気、バイタルサイン正常	
特異項目	801	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	
特異項目	802	赤2	口腔・舌の乾燥	
特異項目	803	赤2	ツルゴール(皮膚の張り・弾力)の減少や皮膚乾燥	
特異項目	804	赤2	尿量減少	
特異項目	805	黄	口渇感の増大(バイタルサイン正常)	
特異項目	806	黄	濃縮尿の症状(バイタルサイン正常)	
特異項目	807	黄	水分摂取量の減少(バイタルサイン正常)	
特異項目	808	黄	経口摂取困難	
		判定なし	該当なし	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	11	めまい
403 回転性めまい 008 失神・失神前状態 (pre-syncope) 406 歩行障害・歩行失調	症状例	「めまい」「目が回る」「めまいがする」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	UzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	UzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	UzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	UzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	UzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	UzSat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O2Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O2Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O2Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O2Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O2Sat 92 - 94%
			判定なし(該当なし)	O2Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR \geq 120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合。特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
			判定なし バイタルサイン正常	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0℃、<36.0℃
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0℃、<36.0℃
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0℃、<36.0℃
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0℃、<36.0℃
特異項目	13.1	赤2	頭位と関係なし	
特異項目	13.2	黄	頭めまい症、他に神経症状を認めない	
特異項目	13.3	赤2	新規発症のリズム障害、不整脈および(または)脈拍数の変化	
特異項目	13.4	赤2	前駆症状を認めないもの	
特異項目	13.5	赤2	労作時発症	
特異項目	13.6	黄	前駆症状を伴うもの、または急な体位変換に伴うもの	
特異項目	13.7	緑	バイタルサインは正常、症状は軽快	
特異項目	13.8	赤2	発症<3時間	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	12	しびれ		
409 四肢の脱力・脳血管障害の症状 410 知覚麻痺・歩行失調	症状例	「手足がしびれる」「手足の感覚がおかしい」「手足がマヒしている」「手足が動かない」など		
大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
		判定なし (該当なし)	O ₂ Sat >94%	
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≧120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したもの)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合. 特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
		判定なし	バイタルサイン正常	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0℃、<36.0℃
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0℃、<36.0℃
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0℃、<36.0℃
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0℃、<36.0℃

特異項目	14.1	赤2	発症<3時間	
特異項目	14.2	黄	発症>3時間または症状軽快	
特異項目	14.3	黄	新たに発症した知覚麻痺・知覚異常	
特異項目	14.4	緑	慢性的な知覚麻痺・知覚異常	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	501	赤2	深在性:急性	スコア8~10
	505	黄	深在性:急性	スコア4~7
出血性素因	701	赤2	頭部(頭蓋内)および頸部	
	702	赤2	胸部、腹部、骨盤、脊椎	
	703	赤2	多量の性器出血	
	704	赤2	腸腰筋および臀部	
	705	赤2	四肢のコンパートメント症候群	
	706	赤2	骨折および脱臼	
	707	赤2	深い裂創・挫創	
	708	赤2	その他の止血困難な状態	
	709	黄	鼻腔(鼻出血)	
	710	黄	口腔(歯肉を含む)	
	711	黄	関節(関節血腫)	
	712	黄	月経過多	
	713	黄	擦過傷および浅い裂傷・挫創	
			判定なし	該当なし

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	13	腰痛		
551 腰背部痛 552 腰背部・脊椎外傷	症状例	「腰が痛い」「ぎっくり腰」「腰痛」など		
大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
			判定なし(該当なし)	O ₂ Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≥120/minまたは<50/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したものを指す)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状を伴う)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合。特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
			判定なし(バイタルサイン正常)	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C
特異項目	15.1	赤2	しびれや麻痺の症状	
特異項目	15.2	赤2	しびれや麻痺の症状と直腸膀胱障害	
特異項目	15.3	緑	腰背部痛	
特異項目	15.4	緑	腰背部・脊椎外傷、軽度の深在性疼痛	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	501	赤2	深在性:急性	スコア8~10
	505	黄	深在性:急性	スコア4~7
	502	黄	深在性:慢性	スコア8~10
	509	黄	深在性:急性	スコア0~3
	506	黄	深在性:慢性	スコア4~7
	510	緑	深在性:慢性	スコア0~3
出血性素因	701	赤2	頭部(頭蓋内)および頭部	
	702	赤2	胸部、腹部、骨盤、脊椎	
	703	赤2	多量の性器出血	
	704	赤2	腸腰筋および臀部	
	705	赤2	四肢のコンパートメント症候群	
	706	赤2	骨折および脱臼	
	707	赤2	深い裂創・挫創	
	708	赤2	その他の止血困難な状態	
	709	黄	鼻腔(鼻出血)	
	710	黄	口腔(歯肉を含む)	
	711	黄	関節(関節血腫)	
	712	黄	月経過多	
	713	黄	擦過傷および浅い裂傷・挫創	
			判定なし	該当なし
受傷機転	601	赤2	同乗者の死亡した車両事故	
	602	赤2	車外に放出された車両事故	
	603	赤2	車の高度な損傷を認める車両事故	
	604	赤2	車に轢かれた歩行者・自転車事故	
	605	赤2	5m以上もしくは30Km/H以上の車に跳ね飛ばされた歩行者・自転車事故	
	606	赤2	運転手が離れていたもしくは30Km/H以上のバイク事故	
	607	赤2	高所からの墜落(6m以上または3階以上を目安)	
	608	赤2	体幹部が挟まれた	
	609	赤2	機械器具に巻き込まれた	
			判定なし	該当なし

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	14	固形物誤飲
265 口腔・食道異物	症状例	「何か固形物を飲み込んだ」「食べ物がのどにつかえた」「のどにひっかかっている・取れない」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	101	赤1	チアノーゼ	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	102	赤1	過度の呼吸努力のため、会話できない状態(単語のみ話せる状態)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	103	赤1	上気道閉塞(あえぎ呼吸・陥没呼吸・シーソー呼吸等含む)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	104	赤1	補助呼吸が必要	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	105	赤1	呼吸音の左右差	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	106	赤1	異常呼吸(中枢性呼吸異常・呼吸様式の異常等)	O ₂ Sat <90% RR10回/分未満または30回/分以上
	107	赤2	とぎれとぎれの会話	O ₂ Sat <92%
	108	赤2	増悪する吸気性喘鳴	O ₂ Sat <92%
	109	黄	呼吸苦	O ₂ Sat 92 - 94%
	110	黄	労作時息切れ	O ₂ Sat 92 - 94%
	111	黄	努力(様)呼吸	O ₂ Sat 92 - 94%
	112	黄	吸気性喘鳴	O ₂ Sat 92 - 94%
			判定なし(該当なし)	O ₂ Sat >94%
循環	201	赤1	ショックの徴候(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	SBP90mmHg以下または200mmHg以上 HR≥120/minまたは<60/min
	202	赤1	起立性失神(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状とともに失神したものを指す)	
	203	赤2	起立性低血圧(病歴で確認されたものを含む)(急に立ち上がった際に、ふらつき・めまい等の症状を伴う)	
	204	赤2	坐位・立位での失神様症状	
	205	赤2	低血圧の疑い(正常血圧や患者の予想される血圧よりも低い場合)	
	206	黄	バイタルサインが正常の上限または下限値である場合。特にその患者の通常の値とは異なっている場合	
			判定なし(バイタルサイン正常)	
意識	301	赤1	舌根沈下	GCS3-8、JCS100-300
	302	赤1	持続する痙攣	GCS3-8、JCS100-300
	303	赤1	意識レベルが次第に増悪するもの	GCS3-8、JCS100-300
	304	赤2	急に出現した短期記憶の新たな障害	GCS9-13、JCS2-30
	305	赤2	急に出現した行動の変容	GCS9-13、JCS2-30
			判定なし	GCS14-15、JCS0-1
発熱	401	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、化学療法またはステロイドを含む免疫抑制剤投与中)	BT>38.0°C、<36.0°C
	402	赤2	心拍数>90またはRR>20	BT>38.0°C、<36.0°C
	403	黄	発熱があり具合悪そうな状態。(紅潮、傾眠傾向、不安・不穏状態)	BT>38.0°C、<36.0°C
	404	緑	発熱があるが苦痛なく落ち着いた状態	BT>38.0°C、<36.0°C
特異項目	16.1	赤2	流涎または吸気性喘鳴	
特異項目	16.2	赤2	嘔声と嚥下障害	
特異項目	16.3	黄	持続する嘔吐	
特異項目	16.4	緑	嚥下・呼吸の問題なし	

【第2段階】

疼痛	501	赤2	深在性:急性	スコア8~10
	505	黄	深在性:急性	スコア4~7
	509	黄	深在性:急性	スコア0~3

症候別 緊急度分類（救急現場プロトコル）

呼吸	重度：過度の呼吸努力により疲労している状態	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数：正常範囲から2SD以上(以下) ※一覧表表示
		P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
		P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
		P104	赤1	上気道閉塞(嚥下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
		P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
		P106	赤1	呼吸音の左右差	
	中等度	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数：正常範囲から1SD以上(以下) ※一覧表表示
		P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
		P109	赤2	呼気の延長	
	軽度	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数：正常範囲内 ※一覧表表示
		P111	黄	労作時息切れ	
		P112	黄	努力(様)呼吸	
		P113	黄	文章単位で会話可能	
		P114	黄	頻回の咳嗽	
		判定なし	(該当なし)	O2Sat >94% 呼吸数：正常範囲内 ※一覧表表示	
循環	ショック：重度の終末臓器不全の徴候 *敗血症性ショックでは紅潮、発熱し、具合が悪そうに見える場合もあ	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 *年齢・月齢の心拍数一覧表表示
		P202	赤1	起立性失神	
	循環動態不安定：	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT>4秒 *年齢・月齢の心拍数一覧表表示
	バイタルサインの異常	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒<CRT≤4秒 *年齢・月齢の心拍数一覧表表示
			判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	意識障害(高度)無反応	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
		P302	赤1	痙攣持続	
		P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
		P304	赤1	舌根沈下	
	意識障害(中等度)	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
	正常(意識清明)		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1

体温	0～3か月	P401	赤2		<36℃
	>3か月	P402	赤2		<32℃
	>3か月	P403	黄		32～35℃
	0～3か月	P404	赤2		>38℃
	>3か月～3歳	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
		P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
		P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	>3歳	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
		P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
		P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃
早産		P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
疼痛	強い痛み	P501	赤2	急性	8～10/10
	急性の弱～中等度の痛み	P502	黄	急性(急性の弱～中等度の痛み)	0～7/10
	慢性の弱い痛み	P503	緑	慢性	0～3/10
出血性 素因	生命または四肢を失う 恐れのある出血	P601	赤2	頭部(頭蓋内)および頸部	
		P602	赤2	胸部、腹部、骨盤、脊椎	
		P603	赤2	多量の性器出血	
		P604	赤2	腸腰筋および腎部	
		P605	赤2	四肢のコンパートメント症候群	
		P606	赤2	骨折および脱臼	
		P607	赤2	深い裂創・挫創	
		P608	赤2	その他の止血困難な状態	
	中等度～軽度の出血	P609	黄	鼻腔(鼻出血)	
		P610	黄	口腔(歯肉を含む)	
		P611	黄	関節(関節血腫)	
		P612	黄	月経過多	
		P613	黄	擦過傷および浅い裂傷・挫創	
			判定なし	該当なし	
受傷機転	ハイリスク受傷機転	P701	赤2	同乗者の死亡した車両事故	
		P702	赤2	車外に放出された車両事故	
		P703	赤2	車の高度な損傷を認める車両事故	
		P706	赤2	車に轢かれた歩行者・自転車事故	
		P707	赤2	5m以上もしくは30Km/H以上の車に跳ね飛ばされた歩行者・自転車事故	
		P709	赤2	運転手が離れていたもしくは30Km/H以上のバイク事故	
		P711	赤2	高所からの墜落(身長2～3倍以上を目安)	
		P712	赤2	体幹部が挟まれた	
		P713	赤2	機械器具に巻き込まれた	
				判定なし	該当なし

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P1	呼吸困難(小児)
651 息切れ	症状例	「息が苦しい」、「呼吸が苦しい」、「息苦しい」、「肩で息をしている」、「息ができない」、「ゼーゼー一いつている」、「ヒューヒュー一いつている」、「息をすするとき音がする」、「痰(たん)がからんだような音がする」、「喘息なんですけど…」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚥下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼気の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	判定なし	(該当なし)		
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT>4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒<CRT≤4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1

体温	P401	赤2		<36℃
	P402	赤2		<32℃
	P403	黄		32~35℃
	P404	赤2		>38℃
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃
早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P1.1	緑	息切れ、苦痛のある症状は認めない	
特異項目	P1.2	赤2	起座呼吸	
特異項目	P1.3	赤2	著明な喘鳴	
特異項目	P1.4	赤2	胸痛	
特異項目	P1.5	赤2	喀血(概ね100ml以上)	
特異項目	P1.6	赤2	著明な浮腫	
特異項目	P1.7	赤2	広範囲湿性ラ音・乾性ラ音	
特異項目	P1.8	赤2	腎不全の人工透析治療中	
特異項目	P1.9	赤2	心筋梗塞、弁膜症、心筋症の治療中	

症候別 緊急度分類（救急現場プロトコル）

症候番号	P2	動悸(小児)
005 動悸・不整脈	症状例	「ドキドキする」、「動悸がする」、「脈が速い」、「脈がとぶ」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚔下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼気の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	判定なし	(該当なし)		
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT > 4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒 < CRT ≤ 4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1

体温	P401	赤2		<36℃
	P402	赤2		<32℃
	P403	黄		32~35℃
	P404	赤2		>38℃
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃
早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P2.1	赤2	心原性の胸痛	
特異項目	P2.2	赤2	致死性不整脈の病歴	
特異項目	P2.3	黄	急性発症、現在も持続している状態	
特異項目	P2.4	緑	動悸の既往、現在は軽快している状態	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P3	意識障害(小児)		
401 意識障害 751 薬物乱用・中毒 752 薬物過量摂取	症状例	「反応がない」、「意識がないようだ」、「変なことを言う」、「うわごとを言っている」、「いつもと様子が違う」、「気を失った」、「気を失いかけた」など		
大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上(以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚔下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上(以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼気の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	
	判定なし	(該当なし)	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示	
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT>4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒<CRT≤4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1
体温	P401	赤2		<36℃
	P402	赤2		<32℃
	P403	黄		32~35℃
	P404	赤2		>38℃
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃

早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P3.11	赤2	低血糖症状がある場合	
特異項目	P3.12	赤2	不明の薬物	
特異項目	P3.13	赤2	逃走の恐れがあるまたは安全が確保できない状態	
特異項目	P3.14	赤2	自殺企図または明確な計画がある	
特異項目	P3.15	黄	自殺念慮はあるが具体的計画のないもの	
特異項目	P3.16	緑	薬物過量摂取	
特異項目	P3.17	赤1	高度脱水(ショック状態を呈す)	
特異項目	P3.18	赤2	項部硬直	
特異項目	P3.19	赤2	頭痛	
特異項目	P3.20	赤2	嘔吐	
特異項目	P3.21	赤2	低酸素環境	
特異項目	P3.22	赤2	高温/低温環境	
特異項目	P3.23	赤2	毒性のある原因物質(毒物・医薬品(強酸・強アルカリ・石油製品・青酸化合物)・覚醒剤・麻薬・毒性のある植物・農薬・家庭用品(防虫剤・殺鼠剤等)・有毒ガス)	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

受傷機転	P701	赤2	同乗者の死亡した車両事故	
	P702	赤2	車外に放出された車両事故	
	P703	赤2	車の高度な損傷を認める車両事故	
	P706	赤2	車に轢かれた歩行者・自転車事故	
	P707	赤2	5m以上もしくは30Km/H以上の車に跳ね飛ばされた歩行者・自転車事故	
	P709	赤2	運転手が離れていたもしくは30Km/H以上のバイク事故	
	P711	赤2	高所からの墜落(身長2~3倍以上を目安)	
	P712	赤2	体幹部が挟まれた	
	P713	赤2	機械器具に巻き込まれた	
		判定なし	該当なし	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P4	けいれん(小児)
405 けいれん	症状例	「ひきつけ」、「てんかん」、「がたがた震えている」、「泡を吹いている」、「白目をむいている」、「けいれんを起こしている」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚥下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼気の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	判定なし	(該当なし)		
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT > 4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒 < CRT ≤ 4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1

体温	P401	赤2		<36℃
	P402	赤2		<32℃
	P403	黄		32~35℃
	P404	赤2		>38℃
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃
早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P4.1	赤1	痙攣持続状態	
特異項目	P4.2	赤2	痙攣停止直後の状態	
特異項目	P4.3	黄	症状軽快、意識レベル正常	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	P501	赤2	急性	8~10/10
	P502	黄	急性(急性の弱~中等度の痛み)	0~7/10
		判定なし	該当なし	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P5	頭痛(小児)
404 頭痛	症状例	「頭が痛い」、「後頭部が痛い」、「頭痛がすると言って倒れた」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚔下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼気の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	判定なし	(該当なし)		
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT > 4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒 < CRT ≤ 4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1

体温	P401	赤2		<36℃
	P402	赤2		<32℃
	P403	黄		32~35℃
	P404	赤2		>38℃
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃
早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P5.1	赤2	突然発症、激しい、これまでで最悪の頭痛	
特異項目	P5.2	赤2	視力障害	
特異項目	P5.3	赤2	視力障害および眼の疼痛	
特異項目	P5.4	緑	慢性・再発性の頭痛	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	P501	赤2	急性	8~10/10
	P502	黄	急性(急性の弱~中等度の痛み)	0~7/10
	P503	緑	慢性	0~3/10
		判定なし	該当なし	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P8	発熱(小児)
852 発熱(小児)	症状例	「熱が出た」「熱がある」「体が熱い」「悪寒がする」「震えている」「熱が下がらない」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上(以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚥下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼気性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上(以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼気の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	判定なし	(該当なし)		
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT>4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒<CRT≤4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1

体温	P401	赤2		<36°C
	P402	赤2		<32°C
	P403	黄		32~35°C
	P404	赤2		>38°C
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38°C
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38°C
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38°C
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38°C
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38°C
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38°C
早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P8.1	赤2	点状出血	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P9	腹痛(小児)
251 腹痛 301 側腹部痛(泌尿器)	症状例	「おなかが痛い」「みぞおちが痛い」「下腹が痛い」「わき腹が痛い」「おなかが張る」「足の付け根が痛い」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等	
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上(以下) ※一覧表表示	
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)		
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)		
	P104	赤1	上気道閉塞(嚥下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)		
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ		
	P106	赤1	呼吸音の左右差		
					O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上(以下) ※一覧表表示
	P107	赤2	過呼吸		
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)		
					O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P109	赤2	呼気の延長		
	P110	黄	呼吸苦		
	P111	黄	労作時息切れ		
					O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
P112	黄	努力(様)呼吸			
P113	黄	文章単位で会話可能			
				O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示	
P114	黄	頻回の咳嗽			
		判定なし	(該当なし)		
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示	
	P202	赤1	起立性失神		
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT>4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示	
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒<CRT≤4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示	
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内	
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300	
	P302	赤1	痙攣持続		
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪		
	P304	赤1	舌根沈下		
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30	
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1	
体温	P401	赤2		<36℃	
	P402	赤2		<32℃	
	P403	黄		32~35℃	
	P404	赤2		>38℃	
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃	
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃	
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃	
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃	
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃	
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃	

早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P9.11	緑	慢性の軽度腹痛	
特異項目	P9.12	緑	慢性の軽度側腹部痛	
特異項目	P9.13	赤2	腹壁緊張または圧痛	
特異項目	P9.14	赤2	腹膜刺激症状	
特異項目	P9.15	赤1	高度脱水(ショック状態を呈す)	
特異項目	P9.16	赤2	高度貧血	
特異項目	P9.17	赤2	グル音消失	
特異項目	P9.18	赤2	有響性金属性グル音	
特異項目	P9.19	赤2	妊娠の可能性あるいは人工妊娠中絶後	
特異項目	P9.20	赤2	吐下血	
特異項目	P9.21	赤2	腹部の異常膨隆	
特異項目	P9.22	赤2	頻回の嘔吐	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	P501	赤2	急性	8~10/10
	P502	黄	急性(急性の弱~中等度の痛み)	0~7/10
	P503	緑	慢性	0~3/10
		判定なし	該当なし	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P10	嘔気・嘔吐(小児)
257 嘔気・嘔吐	症状例	「吐いた」「吐いている」「吐きそう」「気持ちが悪そう」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上(以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚔下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上(以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼吸の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	
	判定なし	(該当なし)	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示	
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT>4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒<CRT≤4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1
体温	P401	赤2		<36℃
	P402	赤2		<32℃
	P403	黄		32~35℃
	P404	赤2		>38℃
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃

早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P10.11	赤2	活動性の多量出血	
特異項目	P10.12	黄	コーヒー残渣様吐物・下血	
特異項目	P10.13	緑	慢性的な嘔吐・嘔気、バイタルサイン正常	
特異項目	P10.14	赤2	頻回の嘔吐あるいは胆汁様の嘔吐	
特異項目	P10.15	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	
特異項目	P10.16	赤2	口腔・舌の乾燥	
特異項目	P10.17	赤2	ツルゴール(皮膚の張り・弾力)の減少や皮膚乾燥	
特異項目	P10.18	赤2	尿量減少	
特異項目	P10.19	黄	口渇感の増大(バイタルサイン正常)	
特異項目	P10.20	黄	濃縮尿の症状(バイタルサイン正常)	
特異項目	P10.21	黄	水分摂取量の減少(バイタルサイン正常)	
特異項目	P10.22	黄	経口摂取困難	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P12	しびれ(小児)
409 四肢の脱力・脳血管障害の症状 410 知覚麻痺・歩行失調	症状例	「手足がしびれる」「手足の感覚がおかしい」「手足がマヒしている」「手足が動かない」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等	
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上(以下) ※一覧表表示	
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)		
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)		
	P104	赤1	上気道閉塞(嚔下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)		
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ		
	P106	赤1	呼吸音の左右差		
	呼吸	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上(以下) ※一覧表表示
		P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
		P109	赤2	呼気の延長	
		P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
		P111	黄	労作時息切れ	
		P112	黄	努力(様)呼吸	
		P113	黄	文章単位で会話可能	
		P114	黄	頻回の咳嗽	
	判定なし	(該当なし)	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示		
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示	
	P202	赤1	起立性失神		
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT>4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示	
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒<CRT≤4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示	
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内	
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300	
	P302	赤1	痙攣持続		
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪		
	P304	赤1	舌根沈下		
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30	
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1	
体温	P401	赤2		<36℃	
	P402	赤2		<32℃	
	P403	黄		32~35℃	
	P404	赤2		>38℃	
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃	
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃	
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃	
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃	
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃	
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃	

早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P12.1	赤2	発症<3時間	
特異項目	P12.2	黄	発症>3時間または症状軽快	
特異項目	P12.3	黄	新たに発症した知覚麻痺・知覚異常	
特異項目	P12.4	緑	慢性的な知覚麻痺・知覚異常	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	P501	赤2	急性	8~10/10
	P502	黄	急性(急性の弱~中等度の痛み)	0~7/10
		判定なし	該当なし	
出血性素因	P601	赤2	頭部(頭蓋内)および頸部	
	P602	赤2	胸部、腹部、骨盤、脊椎	
	P603	赤2	多量の性器出血	
	P604	赤2	腸腰筋および臀部	
	P605	赤2	四肢のコンパートメント症候群	
	P606	赤2	骨折および脱臼	
	P607	赤2	深い裂創・挫創	
	P608	赤2	その他の止血困難な状態	
	P609	黄	鼻腔(鼻出血)	
	P610	黄	口腔(歯肉を含む)	
	P611	黄	関節(関節血腫)	
	P612	黄	月経過多	
	P613	黄	擦過傷および浅い裂傷・挫創	
		判定なし	該当なし	

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P13	腰痛(小児)
551 腰背部痛 552 腰背部・脊椎外傷	症状例	「腰が痛い」「ぎっくり腰」「腰痛」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上(以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚔下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上(以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼吸の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	判定なし	(該当なし)		
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT>4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒<CRT≤4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1
体温	P401	赤2		<36℃
	P402	赤2		<32℃
	P403	黄		32~35℃
	P404	赤2		>38℃
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃

早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P13.1	赤2	しびれや麻痺の症状	
特異項目	P13.2	赤2	しびれや麻痺の症状と直腸膀胱障害	
特異項目	P13.3	緑	腰背部痛	
特異項目	P13.4	緑	腰背部・脊椎外傷、軽度の深在性疼痛	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	P501	赤2	急性	8~10/10
	P502	黄	急性(急性の弱~中等度の痛み)	0~7/10
	P503	緑	慢性	0~3/10
		判定なし	該当なし	
出血性素因	P601	赤2	頭部(頭蓋内)および頸部	
	P602	赤2	胸部、腹部、骨盤、脊椎	
	P603	赤2	多量の性器出血	
	P604	赤2	腸腰筋および腎部	
	P605	赤2	四肢のコンパートメント症候群	
	P606	赤2	骨折および脱臼	
	P607	赤2	深い裂創・挫創	
	P608	赤2	その他の止血困難な状態	
	P609	黄	鼻腔(鼻出血)	
	P610	黄	口腔(歯肉を含む)	
	P611	黄	関節(関節血腫)	
	P612	黄	月経過多	
	P613	黄	擦過傷および浅い裂傷・挫創	
		判定なし	該当なし	
受傷機転	P701	赤2	同乗者の死亡した車両事故	
	P702	赤2	車外に放出された車両事故	
	P703	赤2	車の高度な損傷を認める車両事故	
	P706	赤2	車に轢かれた歩行者・自転車事故	
	P707	赤2	5m以上もしくは30Km/H以上の車に跳ね飛ばされた歩行者・自転車事故	
	P709	赤2	運転手が離れていたもしくは30Km/H以上のバイク事故	
	P711	赤2	高所からの墜落(身長2~3倍以上を目安)	
	P712	赤2	体幹部が挟まれた	
	P713	赤2	機械器具に巻き込まれた	
			判定なし	該当なし

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P14	固形物誤飲(小児)
265 口腔・食道異物	症状例	「何か固形物を飲み込んだ」「食べ物がのどにつかえた」「のどにひっかかっている・取れない」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数: 正常範囲から2SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚥下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数: 正常範囲から1SD以上 (以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼気の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	
	判定なし	(該当なし)	O2Sat >94% 呼吸数: 正常範囲内 ※一覧表表示	
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等))	心拍数正常範囲から2SD以上の 頻脈と以下の徐脈 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの 頻脈と徐脈 CRT > 4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と 徐脈 2秒 < CRT ≤ 4秒 * 年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1

体温	P401	赤2		<36℃
	P402	赤2		<32℃
	P403	黄		32~35℃
	P404	赤2		>38℃
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃
早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P14.1	赤2	流涎または吸気性喘鳴	
特異項目	P14.2	赤2	嘔声と嚥下障害	
特異項目	P14.3	黄	持続する嘔吐	
特異項目	P14.4	緑	嚥下・呼吸の問題なし	

【第2段階】

疼痛	P501	赤2	急性	8~10/10
	P502	黄	急性(急性の弱~中等度の痛み)	0~7/10
	P503	緑	慢性	0~3/10

症候別 緊急度分類 (救急現場プロトコル)

症候番号	P15	頭・顔部外傷(小児)
407 頭部外傷(小児) 105 顔部外傷(小児)	症状例	「頭をぶつけた」「落ちた」「頭から血が出た」など

大項目	コード	緊急度	観察内容	基準値等
呼吸	P101	赤1	チアノーゼ	O2Sat <90% 呼吸数:正常範囲から2SD以上(以下) ※一覧表表示
	P102	赤1	過度の呼吸努力により、会話できない状態(単語のみ含む)	
	P103	赤1	異常呼吸(不規則な呼吸・陥没呼吸・鼻翼呼吸・うめき声など)	
	P104	赤1	上気道閉塞(嚔下障害、流涎、弱々しい声、発語不能、努力性呼吸および呼吸性喘鳴)	
	P105	赤1	ぐったりしている、または、うつろ	
	P106	赤1	呼吸音の左右差	
	P107	赤2	過呼吸	O2Sat <92% 呼吸数:正常範囲から1SD以上(以下) ※一覧表表示
	P108	赤2	呼吸補助筋の使用(肩で息をしている等)	
	P109	赤2	呼気の延長	
	P110	黄	呼吸苦	O2Sat 92 - 94% 呼吸数:正常範囲内 ※一覧表表示
	P111	黄	労作時息切れ	
	P112	黄	努力(様)呼吸	
	P113	黄	文章単位で会話可能	
	P114	黄	頻回の咳嗽	O2Sat >94% 呼吸数:正常範囲内 ※一覧表表示
	判定なし	(該当なし)		
循環	P201	赤1	ショックの徴候(蒼白で冷たい皮膚および冷汗(蒼白・虚脱・冷汗・脈拍触知不能・呼吸困難等)	心拍数正常範囲から2SD以上の頻脈と以下の徐脈 *年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P202	赤1	起立性失神	
	P203	赤2	尿量減少	心拍数正常範囲から1SD~2SDの頻脈と徐脈 CRT>4秒 *年齢・月齢の心拍数一覧表示
	P204	黄	バイタルサインの異常を伴う嘔吐・下痢・出血	心拍数正常範囲から1SDの頻脈と徐脈 2秒<CRT≤4秒 *年齢・月齢の心拍数一覧表示
		判定なし	バイタルサイン正常	正常範囲内
意識	P301	赤1	除脳硬直・除皮質硬直様	GCS3-8、JCS100-300
	P302	赤1	痙攣持続	
	P303	赤1	意識レベルの進行性の増悪	
	P304	赤1	舌根沈下	
	P305	赤2	意識状態と行動の変化(混乱・不穏・異常な興奮・異常な不機嫌等)	GCS9-13、JCS2-30
		判定なし	認知ができる状態。人、場所、時に対する見当識障害を評価。年齢相当のやり取りをする	GCS14-15、JCS0-1
体温	P401	赤2		<36℃
	P402	赤2		<32℃
	P403	黄		32~35℃
	P404	赤2		>38℃
	P405	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P406	赤2	具合悪そうな外観	>38℃
	P407	黄	具合良さそうな外観	>38℃
	P408	赤2	免疫不全患者(好中球減少症、臓器移植患者、ステロイド投与患者)	>38℃
	P409	黄	具合悪そうな外観	>38℃
	P410	緑	具合良さそうな外観	>38℃

早産	P901	赤2	妊娠36週未満の新生児	
特異項目	P15.1	赤2	新たに出現した巣症状	
特異項目	P15.2	黄	意識会消失の病歴	
特異項目	P15.3	黄	長時間の脊柱固定	
特異項目	P15.4	緑	意識消失を認めない	
特異項目	P15.5	赤2	知覚障害、神経学的異常所見	
特異項目	P15.6	赤2	嘔声・嚥下障害	
	901	白	すべての観察項目に該当しない	

【第2段階】

疼痛	P501	赤2	急性	8~10/10
	P502	黄	急性(急性の弱~中等度の痛み)	0~7/10
	P503	緑	慢性	0~3/10
出血性素因	P601	赤2	頭部(頭蓋内)および頭部	
	P602	赤2	胸部、腹部、骨盤、脊椎	
	P603	赤2	多量の性器出血	
	P604	赤2	腸腰筋および臀部	
	P605	赤2	四肢のコンパートメント症候群	
	P606	赤2	骨折および脱臼	
	P607	赤2	深い裂創・挫創	
	P608	赤2	その他の止血困難な状態	
	P609	黄	鼻腔(鼻出血)	
	P610	黄	口腔(歯肉を含む)	
	P611	黄	関節(関節血腫)	
	P612	黄	月経過多	
	P613	黄	擦過傷および浅い裂傷・挫創	
		判定なし	該当なし	
受傷機転	P701	赤2	同乗者の死亡した車両事故	
	P702	赤2	車外に放出された車両事故	
	P703	赤2	車の高度な損傷を認める車両事故	
	P706	赤2	車に轢かれた歩行者・自転車事故	
	P707	赤2	5m以上もしくは30Km/H以上の車に跳ね飛ばされた歩行者・自転車事故	
	P709	赤2	運転手が離れていたもしくは30Km/H以上のバイク事故	
	P711	赤2	高所からの墜落(身長2~3倍以上を目安)	
	P712	赤2	体幹部が挟まれた	
	P713	赤2	機械器具に巻き込まれた	
		判定なし	該当なし	